Les principaux sites d'intérêt ornithologique de Chypre Nord

Voyage naturaliste, mars 2016







Vincent LIEBAULT

Sommaire

Contexte 3

Secteur de plaine entre Nicosie et Framagouste 5

Secteur de la péninsule de Karpas 12

Secteurs de la chaine de Kyrenia 18

Secteur de Koruçam 21

Annexe : les taxons observés 30

Contexte

L'ile de Chypre est une destination reconnue pour l'observation des oiseaux. Elle accueille une diversité importante d'espèces méditerranéennes dont deux espèces endémiques : la Fauvette de Chypre et le Traquet de Chypre.

La frontière qui divise l'ile en deux et les contraintes de traversée amènent bien souvent les ornithologues en séjour à choisir la partie grecque qui offre une plus grande diversité de milieux et plus d'équipements touristiques. Les publications et comptes rendus de voyage concernant la partie turque sont de ce fait beaucoup plus nombreux, ce qui valorise d'autant plus cette partie de l'ile. La partie turque n'en est pourtant pas moins intéressantes. La côte nord et les péninsules sont notamment des sites privilégiés pour l'observation des migrateurs. Chypre se situe en effet entre deux grandes voies de migration, l'une des Balkans vers l'Afrique, et l'autre de la Russie occidentale vers le Sud par la Palestine jusqu'à l'Afrique de l'Est. Les sites naturels de la côte nord sont des lieux propices à l'observation d'oiseaux en haltes migratoires, notamment lorsque les conditions météorologiques sont défavorables.

Ce compte rendu propose une présentation des principaux sites d'intérêt ornithologique de Chypre Nord et la liste des espèces observées lors d'un séjour réalisé du 15 au 24 mars 2016. Ce séjour a permis l'observation de 103 espèces d'oiseaux. La période choisie visait l'observation des migrateurs ainsi que des nicheurs précoces (Francolin noir, Traquet de Chypre, Fauvette de Chypre). Certains nicheurs tardifs n'étaient pas encore arrivés sur leurs sites de nidification (Pie-grièche masquée). Les conditions météorologiques très clémentes ont été peu favorables aux haltes migratoires. Quelques limicoles ont néanmoins pu être observés sur les zones humides ainsi que quelques espèces plus occasionnelles (Busard pâle, Fauvette de Rüppell, Traquet de Finsch).

L'ensemble des informations est également disponible en version géolocalisée au format Google Earth téléchargeable via ce lien :
http://vliebault.free.fr/voyage/Chypre/Chypre2016.kmz



Itinéraire et sites visités



Secteur de plaine entre Nicosie et Framagouste

A l'est de Nicosie, d'importants bassins de lagunage associés aux terres agricoles environnantes attirent de nombreux oiseaux nicheurs et migrateurs typiques des zones humides. En hiver, ce secteur accueil notamment l'Erismature à tête blanche. Dans la continuité de cette zones humide s'étant vers l'est la plaine céréalière de Mesaoria où peuvent être observées à la fois des espèces typiques des plaines agricoles mais aussi des espèces des milieux humides profitant des quelques plans d'eau dont le Lac de Kouklia. Enfin, sur le littoral à proximité de Framagouste, quelques lagunes sont propices à l'observation de limicoles et d'oiseaux en halte migratoire malgré leur état très dégradé.



Secteur de plaine entre Nicosie et Framagouste

1. Lagunage de Nicosie

(35.188635°, 33.426889°)

Vanneau éperonné
Bécassine des marais
Bergeronnette printanière
Canard colvert
Chevalier culblanc
Echasse blanche
Grèbe castagneux
Milan noir
Petit Gravelot



2. Plaine de Strongylos

(35.176227°,33.601091°)

Bergeronnette printanière
Bruant proyer
Cisticole des joncs
Cochevis huppé
Corneille mantelée
Coucou geai
Faucon crécerelle
Francolin noir
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Œdicnème criard
Perdrix Choukar
Pie bavarde
Pigeon ramier
Tourterelle turque



Francolin noir

3. Lac de Kouklia

(35.121706°,33.761030°)

Alouette calandre
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bouscarle de Cetti
Bruant proyer
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Caille des blés
Canard colvert
Canard souchet
Chevalier aboyeur
Chevalier cul-blanc
Chevalier gambette
Chevalier sylvain
Choucas des tours
Cisticole des joncs
Combattant varié
Coucou geai

Echasse blanche
Faucon crécerelle
Foulque macroule
Francolin noir
Gallinule poule d'eau
Gorgebleue à miroir
Gravelot à collier interrompu
Grèbe castagneux
Guêpier d'Europe
Héron cendré
Huppe fasciée
Martinet noir
Mésange charbonnière
Œdicnème criard
Petit gravelot
Pipit farlouse
Râle d'eau
Rousserolle effarvatte
Sarcelle d'hiver
Vanneau éperonné





Vanneau éperonné

4. Lagune de Framagouste

(35.170004°,33.907477°)

Aigrette garzette
Chevalier aboyeur
Cochevis huppé
Courlis cendré
Francolin noir
Gravelot à collier interrompu
Pigeon domestique
Sarcelle d'hiver

5. Vestiges de Salamis

(35.183755°,33.901345°)

Fauvette mélanocéphale
Francolin noir
Goéland d'Audouin
Martinet à ventre blanc
Pouillot véloce
Rougequeue noir
Sterne caugek
Verdier d'Europe



6. Plaine de Yıldırım

(35.247189°,33.783376°)

Fauvette à lunettes
Grive musicienne
Mésange charbonnière
Traquet de Chypre
Traquet motteux



7. Piste de Topçuköy

(35.335192°,33.839947°)

Coucou geai
Fauvette à tête noire
Fauvette de Chypre
Francolin noir
Linotte mélodieuse
Moineau espagnol
Serin cini
Verdier d'Europe





7. Piste à l'est de Kumyalı

(35.438881°,34.171056°)



Bihoreau gris
Bouscarle de Cetti
Bruant proyer
Busard des roseaux
Caille des blés
Chevêche d'Athéna
Coucou geai
Fauvette de Chypre
Fauvette mélanocéphale
Francolin noir
Hirondelle rousseline
Huppe fasciée
Mésange charbonnière
Monticole de roche
Œdicnème criard
Rougegorge familier
Traquet de Chypre
Traquet motteux





Secteur de la péninsule de Karpas

La péninsule de Karpas révèle des paysages typiques avec ses collines ondulées, son maquis et ses terres agricoles extensives. Cette partie de l'île est interdite à la chasse et reste encore bien préservée de l'urbanisation. Il s'agit d'un des secteurs les plus remarquables de Chypre pour l'observation des oiseaux, avec plusieurs espèces endémiques ainsi que des effectifs significatifs pour pas moins de quatre espèces à enjeu mondiale de conservation. Les îles rocheuses de Kleides et l'îlot de Lefkoniso sont notamment les seuls sites de reproduction de Chypre pour le Goéland d'Audouin.



Secteur de la péninsule de Karpas

8. Route de Kumyali à Dipkarpaz

(35.515774°,34.303872°)

Fauvette de Chypre
Francolin noir
Goéland leucophée
Huppe fasciée
Pigeon biset
Tarier pâtre
Traquet de Chypre
Laudakia stellio cypriaca (reptile)
Couleuvre de Chypre *Hierophis cypriensis* (reptile)



Traquet de Chypre



Laudakia stellio cypriaca

9. Route sud entre Dipkarpaz et le cap

(35.601525°,34.435206°)

Buse des steppes
Caille des blés
Fauvette passerinette
Francolin noir
Traquet de Chypre





Francolin noir

10. Dunes de Golden Beach

(35.644347°,34.548399°)

Cormoran huppé
Puffin yelkouan
Goéland d'Audouin





11. Cap de la péninsule de Karpas

(35.695017°,34.587839°)

Faucon crécerelle
Fauvette à lunettes
Fauvette à tête noire
Goéland d'Audouin
Grand cormoran
Héron cendré
Martinet à ventre blanc
Martinet noir
Mésange charbonnière
Pouillot véloce
Traquet de Finsch
Traquet motteux
Traquet isabelle
Phoenicolacerta troodica (Reptile)



Traquet isabelle



Traquet de Finsch





Phoenicolacerta troodica

12. Piste au nord de la péninsule de Karpas

(35.662863°,34.510531°)

Bouscarle de Cetti
Faucon pèlerin
Fauvette à lunettes
Francolin noir
Grand corbeau
Pinson des arbres
Traquet de Chypre





Traquet de Chypre



Traquet de Chypre

13. Piste au nord-est de Dipkarpaz

(35.634540°,34.394035°)

Chevêche d'Athéna
Epervier d'Europe
Francolin noir
Tarier pâtre
Traquet de Chypre



Francolin noir

Secteurs de la chaine de Kyrenia

Ce secteur correspond au massif montagneux qui s'étend le long de la côte nord de l'île. La face sud de la chaine est constituée de pentes escarpées et dénudées qui contrastent avec les pentes plus humides orientées vers le nord recouvert de broussailles et de forêts mixtes de pins et de cyprès. On y trouve des densités importantes de Faucon pèlerin et d'Aigle de Bonelli. C'est aussi un site de nidification pour de nombreuses espèces méditerranéennes et notamment pour les espèces endémiques telles que la Fauvette de Chypre et le Traquet de Chypre.



Secteurs de la chaine de Kyrenia

14. Falaise de Yiouti

35.470391°,34.039639°)


Chevêche d'Athéna
Choucas des tours
Faucon crécerelle
Martinet à ventre blanc
Monticole bleu

15. Est de la chaine de Kyrenia

(35.358053°,33.791077°)

Choucas des tours
Coucou gris
Faucon pèlerin
Fauvette de Chypre
Fauvette mélanocéphale

Linotte mélodieuse
Martinet à ventre blanc
Mésange charbonnière
Monticole bleu
Petit duc scops de Chypre
Traquet de Chypre
Troglodyte mignon



16. Montagne du Kyparissovouno

(35.319201°,33.161774°)

Faucon pèlerin
Monticole bleu
Troglodyte mignon





Secteur de Koruçam

Sur la partie nord-ouest de l'île s'étend la péninsule de Koruçam, avec sa côte rocheuse, de vastes étendues de garrigue, des parcelles de pinède de basse altitude et de terres céréalières extensives. Plus au sud, le littoral rocheux laisse place aux dunes et aux embouchures de plusieurs cours d'eau formant des écosystèmes particulièrement riches. Ce secteur est réputé pour l'observation d'oiseaux en migration ou en halte migratoire.



Secteur de Koruçam

17. Est de Koruçam

(35.364092°,32.989486°)

Chevêche d'Athéna
Fauvette de Chypre
Fauvette de Rüppell
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rochers
Hirondelle rousseline
Œdicnème criard
Pipit des arbres
Tarin des aulnes









Fauvette de Rüppell

18. Cap Koruçam

(35.396346°,32.926110°)

Alouette calandrelle
Bruant cendrillard
Bruant proyer
Busard pâle
Effraie des clochers
Faucon d'Eléonore
Fauvette de Chypre
Francolin noir

Guêpier d'Europe
Linotte mélodieuse
Œdicnème criard
Rougequeue à front blanc
Serin cini
Tarin des aulnes
Traquet isabelle
Traquet motteux
Traquet oreillard
Laudakia stellio cypriaca (Reptile)



Laudakia stellio cypriaca



Busard pâle



Bruant cendrillard





Bruant proyer



Traquet oreillard



Traquet isabelle

19. Körmacit Deresi et son embouchure

(35.336100°,32.957107°)

Alouette calandrelle
Bruant cendrillard
Caille des blés
Chevêche d'Athéna
Cochevis huppé
Fauvette à lunettes
Fauvette de Chypre
Francolin noir
Gravelot à collier interrompu
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rousseline
Œdicnème criard
Pipit des arbres
Rougegorge familier
Tarier des prés
Traquet de Chypre
Traquet oreillard
Verdier d'Europe
Ophisops elegans (Reptile)




Bruant cendrillard











20. Embouchure du Çiftlik Deresi

(35.268664°,32.936346°)

Alouette calandrelle
Caille des blés
Cochevis huppé
Coucou geai
Fauvette à lunettes
Francolin noir
Mésange charbonnière
Pipit des arbres
Œdicnème criard
Ophisops elegans (Reptile)









Ophisops elegans

Annexe : liste des taxons observés

Taxon	UICN
Aigrette garzette *(Egretta garzetta)*	LC
Alouette calandre *(Melanocorypha calandra)*	LC
Alouette calandrelle *(Calandrella brachydactyla)*	LC
Bécassine des marais *(Gallinago gallinago)*	LC
Bergeronnette grise *(Motacilla alba)*	LC
Bergeronnette printanière *(Motacilla flava)*	LC
Bihoreau gris *(Nycticorax nycticorax)*	LC
Bouscarle de Cetti *(Cettia cetti)*	LC
Bruant cendrillard *(Emberiza caesia)*	LC
Bruant proyer (*Miliaria calandra*)	LC
Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)	LC
Busard pâle (*Circus macrourus*)	NT
Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*)	LC
Buse des steppes (*Buteo buteo vulpinus*)	LC
Caille des blés (*Coturnix coturnix*)	LC
Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)	LC
Canard souchet (*Anas clypeata*)	LC
Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*)	LC
Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*)	LC
Chevalier gambette (*Tringa totanus*)	LC
Chevalier sylvain (*Tringa glareola*)	LC
Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*)	LC
Choucas des tours (*Corvus monedula*)	LC
Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*)	LC
Cochevis huppé (*Galerida cristata*)	LC
Combattant varié (Philomacus pugnax)	LC

Taxon	UICN
Cormoran huppé (*Phalacrocorax aristotelis*)	LC
Corneille mantelée (*Corvus cornix*)	LC
Coucou geai (*Clamator glandarius*)	LC
Coucou gris (*Cuculus canorus*)	LC
Courlis cendré (*Numenius arquata*)	LC
Echasse blanche *(Himantopus himantopus)*	LC
Effraie des clochers *(Tyto alba)*	LC
Epervier d'Europe *(Accipiter nisus)*	LC
Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)	LC
Faucon d'Eléonore (*Falco eleonorae*)	LC
Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*)	LC
Fauvette à lunettes (*Sylvia conspicillata*)	LC
Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)	LC
Fauvette de Chypre (*Sylvia melanothorax*)	LC
Fauvette de Rüppell (*Sylvia ruppeli*)	LC
Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*)	LC
Fauvette passerinette (*Sylvia cantillans*)	LC
Foulque macroule (*Fulica atra*)	LC
Francolin noir (*Francolinus francolinus*)	LC
Gallinule poule-d'eau (*Gallinula chloropus*	LC
Goéland d'Audouin (*Larus audouini*)	NT
Goéland leucophée (*Larus cachinnans*)	LC
Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*)	LC
Grand Corbeau (*Corvus corax*)	LC
Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo)*	LC
Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*)	LC

Taxon	UICN
Grèbe castagneux (*Tachybaptus rufficollis*)	LC
Grive musicienne (*Turdus philomelos*)	LC
Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*)	LC
Héron cendré (*Ardea cinerea*)	LC
Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*)	LC
Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne rupestris*)	LC
Hirondelle rousseline (*Hirundo daurica*)	LC
Hirondelle rustique (*Hirundo rustica)*	LC
Huppe fasciée (*Upupa epops*)	LC
Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)	LC
Martinet à ventre blanc (*Tachymarptis melba*)	LC
Martinet noir (*Apus apus*)	LC
Mésange charbonnière (*Parus major*)	LC
Milan noir (*Milvus migrans*)	LC
Moineau domestique (*Passer domesticus*)	LC
Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)	LC
Monticole bleu (*Monticola solitarius*)	LC
Monticole de roche (*Monticola saxatilis*)	LC
Oedicnème criard (*Burhinus oedicnemus*)	LC
Perdrix choukar (*Alectoris chukar*)	LC
Petit-duc scops (*Otus scops cyprius*)	LC
Petit Gravelot (*Charadrius dubius*)	LC
Pie bavarde (*Pica pica*)	LC
Pigeon biset (*Columba livia*)	LC
Pigeon domestique (*Columba livia domestica*)	LC
Pigeon ramier (*Columba palumbus*)	LC
Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*)	LC
Pipit des arbres (*Anthus trivialis*)	LC
Pipit farlouse (*Anthus pratensis*)	LC
Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)	LC
Puffin yelkouan (*Puffinus yelkouan*)	LC
Râle d'eau (*Rallus aquaticus*)	LC
Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*)	LC
Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*)	LC
Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*)	LC
Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*)	LC
Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*)	LC
Serin cini (*Serinus serinus*)	LC
Sterne caugek (*Sterna sandvicensis*)	LC
Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)	LC
Tarier pâtre (*Saxicola torquata*)	LC
Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*)	LC
Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*)	LC
Traquet de Chypre (*Oenanthe cypriaca*)	LC
Traquet de Finsch (*Oenanthe finschii*)	LC
Traquet isabelle (*Oenanthe isabellina*)	LC
Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*)	LC
Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica*)	LC
Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*)	LC
Vanneau éperonné (*Vanellus spinosus*)	LC
Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)	LC