Voyage ornithologique en Mongolie
La migration postnuptiale dans les steppes

Du 18 au 30 août 2018





Willy Raitière

Sommaire

Participants 2
Déroulement du voyage et conditions météorologiques 2
Coordonnées géographiques des camps de yourtes et des principaux sites d'intérêt 5
Observations jour par jour 6

Liste commentée des espèces observées par ordre systématique 18
Réflexions sur la migration 69

Reptiles 70
Amphibiens 71
Mammifères 71
Papillons 72

Participants

Claude Balcon, Marine Delacoste, Paul Doniol-Valcroze, Yves Dubois, Julien Gernigon, Christian Gloria, Sébastien Mauvieux, Sébastien Provost, Willy Raitière et Hugo Touzé

Guide : Lkhagvachuluun Bayasakh (agence Guyug Ayhan)

Déroulement du voyage et conditions météorologiques

Jour 1 – 18/08/18 – temps chaud et ensoleillé, pas de vent

- Atterrissage à Oulan-Bator
- Prospection des rives de la rivière Tula
- Arrivée à Bogt Khan (1er camp de yourtes)

Jour 2 – 19/08/18 – ciel voilé et venteux le matin, se dégageant rapidement puis temps chaud et ensoleillé avec du vent

- Prospection à Bogt Khan
- Passage à Gun Galutaï
- Passage à Gargal Tkhan
- Arrivée à Chinggis Toonot (2me camp de yourtes)

Jour 3 – 20/08/18 – temps chaud et ensoleillé, avec du vent

- Prospection autour du camp de Chinggis Toonot
- Prospection de toute la vallée de la rivière Khurkh à partir de Binder
- Retour au camp de Chinggis Toonot

Jour 4 – 21/08/18 – temps chaud et ensoleillé, pas de vent, ciel voilé en soirée

- Prospection autour du camp de Chinggis Toonot
- Route vers le camp « Steppe nomads » (3me camp de yourtes)

Jour 5 – 22/08/18 – ciel couvert, sans vent le matin puis dégagé et chaud l'après-midi (pas mal de brumes de chaleur)

- Prospection autour du camp « Steppe nomads »
- Visite des montagnes autour du camp

- Passage à Gun Galutaï
- Route vers le camp « Bayan Bulag » (4me camp de yourtes)

Jour 6 – 23/08/18 – temps chaud et ensoleillé

- Prospection autour du camp de « Bayan Bulag »
- Passage à Sum-Khukh-Burd
- Route vers le camp de la vallée d'Ongi (5me camp de yourtes)

Jour 7 – 24/08/18 – temps chaud et ensoleillé, orages avec pluie en soirée et pendant la nuit

- Prospection autour du camp de la vallée d'Ongi

Jour 8 – 25/08/18 – rares averses le matin, temps couvert et froid le matin puis se dégageant l'après-midi

- Prospection autour du camp de la vallée d'Ongi

Jour 9 – 26/08/18 – temps chaud et ensoleillé

- Prospection rapide autour du camp de la vallée d'Ongi
- Passage à Sangin Dalaï
- Visite des temples de Kharkhorin
- Route vers le lac Ogi (6me camp de yourtes)

Jour 10 – 27/08/18 – temps chaud et ensoleillé

- Prospection tout autour du lac Ogi

Jour 11 – 28/08/18 – temps chaud et ensoleillé

- Prospection autour du lac Ogi
- Passage à Elsen Tasarkhaï
- Arrivée et prospection autour du camp Bayan Gobi (7me camp de yourtes)

Jour 12 – 29/08/18 – couvert le matin avec des températures élevées, averses de pluie et vent l'après-midi

- Prospection autour du camp Bayan Gobi
- Passage à Bayan Nuur
- Route vers Oulan Bator
- Prospection dans les marais d'Oulan Bator
- Arrivée au camp Munkhtenger (8me camp de yourtes)

Jour 13 – 30/08/18 – temps calme et ensoleillé

- Prospection autour du camp Munkhtenger
- Départ vers l'aéroport d'Oulan Bator
- Arrivée à l'aéroport de Bichkek (Kyrgyzstan)
- Prospection autour de l'aéroport
- Retour à Paris



Coordonnées géographiques des camps de yourtes et des principaux sites d'intérêt

Camp 1 (Bogt Khan) : 47.7466731°N / 107.0178514°E
Camp 2 (Chinggis Toonot) : 48.5813925°N / 110.6919389°E
Camp 3 (Steppe Nomads) : 47.6048898°N / 108.395904°E
Camp 4 (Bayan Bulag) : 46.2305591°N / 106.0699702°E
Camp 5 (Vallée d'Ongi) : 45.3364795°N / 104.0077079°E
Camp 6 (Bayan Gobi) : 47.7868642°N / 102.8079987°E
Camp 7 (lac Ogi) : 47.2824491°N / 103.7581088°E
Camp 8 (Munkhtenger) : 47.7985711°N / 106.8015239°E
Gun Galutaï : 47.6335137°N / 108.3012392°E
Gargal Tkhan : 47.5058179°N / 109.4942002°E
Vallée de la rivière Khurkh : 48.4779661°N / 110.3895391°E
Sum Khurkh Burd : 46.1570017°N / 105.760443°E
Sangin Dalaï : 46.6715081°N / 103.3175762°E
Elsen Tasarkhaï : 47.3546881°N / 103.6814783°E
Lac Ogi : 47.7868642°N / 102.8079987°E
Lac Bayan : 47.8483191°N / 104.3344995°E Statue équestre de Gengis Kha



Observations jour par jour

Samedi 18/08/18

Arrivée à l'aéroport d'Oulan-Bator en milieu de matinée. En sortant de l'aérogare, observation d'un **Aigle botté**, d'un **Milan brun**, de 3 **Hirondelles rustiques** et de 10 **Moineaux domestiques**. Nous prenons ensuite la route vers les bords de la rivière Tula. Nous observons alors nos 3 premières **Grues demoiselles**. Arrivés sur les bords de la rivière, de nombreuses familles sont là pour pique-niquer.

A noter pour plus tard : éviter les bords de la rivière Tula le week-end.

Malgré tout, nous observerons, entre autres, nos premiers **Choucas de Daourie**, une dizaine de **Faucons de l'Amour** adultes qui passent avec de la nourriture dans les serres, quelques **Vautours moines**, notre premier **Pouillot boréal**, 1 **Rémiz couronnée**, au moins 2 **Sitelles torchepots ssp. *asiatica*** et quelques **Bergeronnettes grises *ssp. baicalensis***.

Nous reprenons ensuite la route vers notre 1er camp de yourtes : Bogt Khan.



Environs du camp Bogt Khan © Willy Raitière

Sur la route : 1 **Buse de Chine**. Arrivés au premier à Bogt Khan en fin d'après-midi, nous sommes accueillis par un groupe (famille ?) de 6 **Faucons sacres**, de nombreux (au moins 20) **Milans bruns** et 1 **Traquet pie** mâle. Nous irons ensuite prospecter la taïga autour du camp. Nous observerons entre autres 3 **Pouillots bruns**, 2 **Pouillots à grands sourcils**, 2 **Pouillots boréaux**, 1 **Fauvette babillarde**, 1 jeune **Pie-grièche brune**, 1 **Calliope de Sibérie**, au moins 2 **Gobemouches de la Taïga**, 2 **Robins à flancs roux**, 2 **Grives à gorge rousse**, au moins 3 **Cassenoix mouchetés ssp. *macrorhynchos*** et 1 **Pipit à dos olive**.

Dimanche 19/08/18

Levés très tôt, nous partons prospecter la taïga de nouveau. De nouvelles espèces sont observées : 5 **Tourterelles orientales**, 1 **Rousserolle à gros bec**, 1 **Locustelle lancéolée**, 1 **Rougequeue aurore**, 1 **Tarier de Sibérie**, 2 **Roselins cramoisis** et 2 **Bruants à calotte blanche**.

Nous entamons ensuite une longue route vers la vallée de la rivière Khurkh. Nous observerons notre 1er Aigle des steppes le long de la route. Au passage, nous faisons une halte sur les plans d'eau de Gun Galutaï. Ces sites sont très riches en limicoles, anatidés et sternidés. Parmi les espèces notables, on peut citer le **Tadorne casarca**, le **Cygne chanteur**, le **Pluvier fauve** (240 individus), le **Bécasseau à queue pointue** (5 individus), le **Bécasseau à cou roux** (4 individus), le **Chevalier bargette** (2 individus), le **Phalarope à bec étroit** (9 individus), le **Chevalier de Sibérie** (1 individu), la **Guifette leucoptère** (2 individus), la **Pie-grièche brune** (1 individu) et la **Bergeronnette citrine** (plusieurs dizaines d'individus).

Une halte sur le plan d'eau de Gargal Tkhan n'apportera pas de nouvelle espèce d'oiseau d'eau mais nous permettra d'observer notre première **Niverolle du Père David**. Quelques haltes sur la piste menant au camp de yourte nous permettront d'observer nos 2 premières **Grues à cou blanc**, des **Faucons de l'Amour** et **sacre**. Nous arriverons de nuit au camp de Chinggis Toonot.

Lundi 20/08/18

Levés tôt, nous prospectons les rives de la rivière Khurkh à proximité du camp. La zone est riche en passereaux. Nous observerons donc entre autres de nombreux **Pouillots à grands sourcils**, **Pouillots bruns** et **Pouillots boréaux**, 1 **Pouillot de Pallas**, 3 **Locustelles de Pallas**, 2 **Gobemouches de la taïga**, de très nombreux **Rougequeues aurores** (des groupes familiaux notamment), 1 **Tarier de Sibérie**, 1 **Pipit à dos olive**, 2 **Roselins cramoisis**, une trentaine de **Pies bleues**, 1 **Pie-grièche brune**, un vol de 11 **Oie cygnoïdes**, 1 **Pic cendré, 1 Pygargue à queue blanche** et 1 **Faucon sacre**.

Après le petit-déjeuner, nous partons prospecter la vallée de la rivière Khurkh en commençant par la lagune de Binder. Ce site accueille quelques limicoles intéressants dont 1 **Bécasseau à queue pointue**, 1 **Bécasseau à cou roux** et 8 **Bécasseaux de Temminck**.

La vallée de la rivière Khurkh accueille une quantité impressionnante de grues. Les plus nombreuses sont les **Grues demoiselles** (près d'un millier observé au total), suivies de la **Grue à cou blanc** (une 15ne observée), de la **Grue cendré** (une 15ne également) et enfin de la très rare **Grue de Sibérie** (1 individu observé sur une lagune en compagnie de 2 Grues à cou blanc ; 48.4599901°N / 110.3157072°E). Lors de cette prospection nous observerons également plusieurs **Locustelles de Pallas**, des **Oies cygnoïdes**, des **Busards d'Orient**, des milliers de **Choucas de Daourie** (jeunes et adultes), 1 **Pipit de Richard** ainsi qu'un nouveau **Chevalier de Sibérie**. Nous revenons en fin d'après-midi au camp de Chinggis Toonot en croisant d'impressionnants groupes de **Choucas de Daourie** rejoignant leur dortoir.



Rivière Khurkh aux environs du camp Chinggis Toonot © Willy Raitière

Mardi 21/08/18

Nouvelle prospection matinale des rives de la rivière Khurkh autour du camp. Parmi les temps forts, on peut noter ces 115 **Pies bleues** quittant leur dortoir, 2 **Hibou Grand-Duc** nous survolant, 1 troupe d'une vingtaine de **Mésanges à longue queue ssp. caudatus**, notre premier **Gobemouche brun**, quelques **Tourterelles orientales** et **Grives à gorge rousse**, un **Bruant masqué**, 1 **Fauvette babillarde** et 1 mâle de **Calliope de Sibérie** (un peu lointain malheureusement).

Nous partons après le petit-déjeuner pour une longue piste pour le 3ième camp : « Steppe Nomads ».

Dans la steppe, un groupe de limicoles attire notre attention et 2 **Courlis nains** seront repérés parmi des **Barges à queue noires**, des **Pluviers fauves** et des **Vanneaux huppés**. En passant dans le village d'Umnudelger, nous observerons notre premier **Etourneau gris**. Nous arriverons au camp « Steppe Nomads » tard dans l'après-midi.

Mercredi 22/08/18

Notre prospection matinale autour du camp nous permettra d'observer entre autres 1 **Rousserolle à gros bec**, 2 **Pouillots bruns**, 1 **Pouillot boréal**, 1 **Pie-grièche brune**, 1 **Locustelle de Pallas**, 1 **Gobemouche de la taïga**, 1 couple de **Pipit de Godlewski** (couple nicheur avec cris d'alarme notamment) et un groupe important de **Moineaux soulcies**.

Après une expédition dans les montagnes environnantes avec un guide nous montrant plusieurs groupes d'Argalis, nous partons pour une longue journée de route qui nous emmènera jusque dans la partie nord du désert de Gobi.

Nous repassons par Gun Galutaï. Nous y observerons sensiblement les mêmes espèces que précédemment. Les nouveautés sont 1 jeune mâle de **Macreuse à ailes blanches ssp. *stejnegeri*** (la seule du séjour) et au moins 6 **Bécassines à queue pointue**. Lors d'un arrêt pour faire le plein de carburant dans la ville de Zuunmod, un **Aigle impérial** de 1re année (le seul du séjour) nous survole.

Sur la route, nous croiserons également pas mal d'Aigles des steppes et de Faucons sacres, 1 Aigle royal et bien entendu, l'ultra présent Vautour moine. Arrivés dans le désert de Gobi (46.46165740°N / 106.4769844°E) qui pour l'occasion est entièrement vert (il a beaucoup plu dans les semaines précédentes), recouvert par la ciboulette en fleur, nous observerons pas mal **d'Alouettes haussecol ssp. *brandti***, des **Alouettes de Mongolie** ainsi que nos premières **Alouettes de Swinhoe**.

Quelques kilomètres plus loin, nous verrons nos premiers **Syrrhaptes paradoxaux** (46.4620569°N / 106.4395961°E). Alors que nous progressons sur la piste, nous croiserons un groupe de plusieurs centaines de Gazelles à queue blanche. Nous arriverons au camp de Bayan Bulag en fin d'après-midi, sous une lumière de fin de journée magnifique. Une petite balade autour du camp nous permettra d'observer notamment 1 **Niverolle du Père David**, 1 **Traquet pie**, 1 **Gobemouche brun**, 1 **Gobemouche gris** et **5 Martinets de Sibérie**.



Environs du camp Bayan Bulag © Willy Raitière

Jeudi 23/08/18

Les plus motivés profitent des premières heures du jour pour se promener autour du camp de Bayan Bulag puis nous reprenons la route pour terminer notre traversée de cette partie nord du désert de Gobi jusqu'au camp de la vallée d'Ongi.

Nous nous arrêtons rapidement après être parti du camp pour observer un énorme nid de **Vautour moine** sur un arbre ainsi que 2 **Martinets de Sibérie** haut dans le ciel.

Après avoir quitté une zone rocheuse, nous retrouvons le désert plat et caillouteux. Une nouvelle halte nous permettra d'observer une **Fauvette du désert** accompagnée de **Traquets isabelles** et d'un **Traquet pie**.

Nous nous arrêtons ensuite à Sum-Khukh-Burd, site qui s'avère très riche et varié en dépit des aménagements touristiques discutables réalisés récemment. Parmi les espèces les plus intéressantes du site : **Bruant de Pallas**, **Busard d'Orient**, **Bécasseau à longs doigts**, **Bécassine à queue pointue**, **Bécassine de Swinhoe**, **Pipit de Godlewski**…

Alors que nous nous approchons d'Ongi, nous levons d'énormes groupes de **Syrrhaptes paradoxaux** regroupant parfois plusieurs centaines d'individus. Le spectacle est réellement époustouflant. Arrivés dans la zone montagneuse menant au camp d'Ongi, nous observerons une nouvelle **Fauvette naine** sur le bord de la route.

Arrivés en fin d'après-midi au camp d'Ongi, nous ferons une balade sur les bords de la rivière. Des groupes de **Syrraptes paradoxaux** passent en vol (plusieurs dizaines au total) dans la vallée et nous observons notre premier **Pouillot à pattes sombres**, 2 **Pouillots bruns**, 1 **Pouillot boréal**, 2 **Rousserolles à gros bec**, 2 **Gobemouches bruns**, 2 **Gobemouches de la Taïga** et une dizaine de **Roselins cramoisis**. A l'heure de l'apéritif, nous observons un énorme dortoir mixte de **Faucons crécerellettes** et **crécerelles** (environ 200 oiseaux) se rassemblant avant de se coucher dans les ormes près du camp.

Vendredi 24/08/18

La journée entière sera dédiée à la prospection des alentours du camp, le long de la rivière, en amont et en aval.

De nombreux **Syrraptes paradoxaux** sont de nouveau observés (au moins 380 individus en près de 3 h le matin) en vol, de même que notre première **Bondrée orientale**. Le secteur accueille de bons groupes de **Perdrix choukar**, mais également plusieurs **Aigles bottés**, 1 **Epervier du Japon**, 1 **Pie-grièche isabelle**, 1 **Locustelle lancéolée**, 4 **Bruants de Pallas**, 1

Rousserolle isabelle, quelques **Pipit à dos olive**, 1 **Pouillot de Sibérie**, 1 **Rousserolle à gros bec**, 1 **Gobemouche brun**, 5 **Gobemouches de la Taïga**, 1 **Pouillot à pattes sombres**, 1 **Pouillot à grands sourcils**, 1 **Coucou gris ou oriental** et 1 **Gobemouche à croupion jaune** qui écourtera la sieste de quelques-uns.

L'après-midi, une prospection menée dans les zones montagneuses situées entre le camp et le village de Saikhan-Ovoo permettra à certains d'observer une **Pie-grièche des steppes**, 2 **Podoces d'Henderson** et quelques **Traquets du désert** notamment. Le temps se couvre en soirée et des orages éclatent.



Vallée d'Ongi. © Willy Raitière

Samedi 25/08/18

Le temps perturbé de la nuit a manifestement bloqué beaucoup de passereaux migrateurs le long de la rivière. Les effectifs observés sont impressionnants. Il y a notamment des **Gobemouche de la Taïga** partout (110 individus estimés). Les **Pouillots bruns** sont également très nombreux (60 individus), de même que les **Pouillots à pattes sombres** (40), les **Pouillots boréaux** (30), les **Pouillots à grands sourcils** (15), les **Gobemouches bruns** (40), les **Pipits à dos olive** (15) et les **Roselins cramoisis** (70). Parmi les nouvelles espèces intéressantes, notons un **Coucou oriental**, un **Pouillot siffleur** (rare en Mongolie), un (nouveau ?) **Gobemouche à croupion jaune**, 1 **Pouillot de Hume**, 4 **Bondrées orientales**, 1 **Epervier du Japon**, nos premiers **Gobemouches de Sibérie**, 1 **Grive obscure** twitchée à la nuit tombante et 1 **Grive à gorge rousse**.

Une séance de sky-watching en début d'après-midi permettra notamment d'observer un **Gypaète barbu**.

Dans l'après-midi, nous nous rendons chez une famille d'éleveurs nomades et au retour nous prospecterons de nouvelles zones favorables au **Podoce de Henderson** et ce sont 5 individus au total qui seront observés, ainsi que quelques **Traquets du désert**, 2 **Fauvettes naines**, une centaine de **Syrraptes paradoxaux** et un groupe de 23 **Bondrées orientales** en fin de journée.

Dimanche 26/08/18

Après une rapide prospection autour du camp de la vallée d'Ongi qui n'apportera rien de nouveau, nous partons tôt car une longue route nous attend vers le lac Ogi.

Sur la route, nous croiserons quelques **Alouettes de Swinhoe**, 1 très beau mâle de **Bondrée orientale** cerclant juste au-dessus des voitures, des groupes de **Pluviers fauves** autour des plans d'eau, 2 **Spatules blanches**, des groupes de très nombreuses **Niverolles du Père David**, des **Alouettes mongoles** et des **Syrraptes paradoxaux**.

Une petite halte dans une vallée (46.5747737°N / 103.2481779°E) nous permettra d'observer un grand nombre de rapaces : 2 **Gypaètes barbus**, de nombreux **Vautours moines**, 1 **Vautour de l'Himalaya**, 1 **Aigle criard** (lointain), de nombreuses **Buses de Chine**, **Faucons sacres** et **Aigles des steppes** et 1 **Faucon pèlerin**. Un peu plus loin, la lagune de Sangin Dalaï est un site extrêmement riche en anatidés (**Oie à tête barrée** et **Oie cygnoïde** notamment), limicoles et rapaces (les **Buses de Chine**, les **Aigles des steppes** et les **Faucons sacres** sont particulièrement nombreux).

Nous passons ensuite par la ville de Kharkhorin et nous visitons ses fameux temples.

Nous filons ensuite sans nous arrêter vers le camp du lac Ogi où nous arrivons en fin d'après-midi. Un rapide coup d'œil sur le lac depuis le camp nous permettra d'observer quelques **Goélands ichthyaètes**.

Lundi 27/08/18

Toute la journée sera consacrée à la prospection du lac Ogi et de la petite lagune située à l'est.

Les alentours du camp de yourtes sont riches en **Bruant de Pallas**, **Niverolle du Père David** et **Pipit de Godlewski**.

En parcourant la totalité du tour du lac, il s'avère que la lagune située à l'est du lac ainsi que les prairies humides de l'extrémité ouest de celui-ci sont les sites les plus intéressants. Parmi les très nombreuses espèces observées, on peut citer le **Pluvier fauve** (environ 550 individus dénombrés), les **Bécasseaux falcinelles**, **à queue pointue**, **à longs doigts** et **à cou roux**, le **Chevalier bargette**, le **Courlis nain** (au moins 6 oiseaux au total), le **Goéland ichthyaète** et la **Guifette leucoptère**.

Mardi 28/08/18

Avant de partir, une petite prospection matinale autour du camp n'apportera rien de notable.

Nous quittons donc le lac Ogi en direction du sud-est. Nous jetons un dernier coup d'œil à la lagune située à l'est du lac. Ce site est toujours aussi riche en limicoles notamment : **Petit Gravelot**, **Barge à queue noire**, **Bécasseaux falcinelle**, **à queue pointue**, **cocorli**, **de Temminck**, **à longs doigts**, **à cou roux** et **minute**, **Bécassines des marais** et **à queue pointue/de Swinhoe**, **Phalarope à bec étroit**, **Chevaliers bargette**, **sylvain** et **gambette**. Le site est également fréquenté par des groupes impressionnants de **Niverolles du Père David**.

Juste avant d'arriver au nouveau camp, nous faisons une halte sur la zone humide de Elsen Tsarkhaï. Le paysage y est étonnant, avec une succession d'habitats très inhabituelle pour nous. En quelques dizaines de mètres, on passe des dunes de sable à une zone humide entourée de roselière en passant par des prairies pâturées par du bétail. Ce site nous permettra d'observer nos seuls **Canards de Chine** du séjour mais également une belle troupe d'**Oies à tête barrée**, 3 **Grues à cou blanc**, 1 **Busard d'Orient**, au moins 3 **Hirondelles pâles**, 4 **Gallinules poule-d'eau** et 1 **Vautour de l'Himalaya**.

Après nous être installés dans le camp de yourtes de Bayan Gobi, nous partons à la découverte des environs, sur et autour de la petite montagne qui domine le camp. Là encore le paysage est superbe. Quelques passereaux sont observés dans les ormes et les buissons : **Pouillot de Hume**, **Fauvette babillarde**, **Pouillot brun**, **Gobemouche de la taïga**, **Traquet motteux**, **pie** et **isabelle**, **Bruant à longue queue**, **Bruant à cou gris** et **Bruant auréole**.



Environs du camp Bayan Gobi. © Willy Raitière

Mercredi 29/08/18

Une balade matinale autour du camp permettra d'observer sensiblement les mêmes espèces que la veille.

Nous reprenons la route assez tôt pour nous diriger vers le nord et le lac Bayan. Une petite halte dans la bourgade de Dashinchilen nous permettra de bien observer l'**Hirondelle pâle**.

La zone humide du lac Bayan est intéressante et nous permettra de faire quelques belles observations de limicoles (**Bécasseaux à queue pointue**, **à longs doigts** et **de Temminck** notamment) mais malheureusement nous n'avons pas le temps de prospecter plus en détail le lac salé qui accueille pourtant des troupes importantes d'**Avocettes élégantes** notamment.

Nous reprenons donc la route (goudronnée cette fois) vers Oulan Bator et notamment les plans d'eau et zones humides situés dans la banlieue ouest de la capitale.

Arrivés sur place, nous jetons un coup d'œil aux anatidés présents sur les plans d'eau mais rien de notable n'est observé.

Nous nous dirigeons ensuite vers les bords de la rivière Tula et nous ferons quelques observations originales comme ces **Harles bièvres**, nos premières **Mésange azurées** ou encore un **Pic à dos blanc**. Nous arrivons à notre dernier camp de yourte en début de soirée alors que quelques **Faucons de l'Amour** volent encore au-dessus des petits boisements de bouleaux autour du camp.

Jeudi 30/08/18

Nous avons quelques heures avant de devoir nous rendre à l'aéroport aussi, nous en profitons pour prospecter la taïga dans les environs du camp dès le lever du soleil.

Il y a pas mal de passereaux dans les buissons : une dizaine de **Pouillots à grands sourcils**, de **Pouillots bruns** et de **Pouillots boréaux**, des **Pouillots de Sibérie** à l'unité, une quinzaine de **Pipits à dos olive**, quelques **Gobemouches bruns** et **de la taïga**, 1 **Calliope de Sibérie**, 1 **Pie-grièche brune**, quelques **Roselins cramoisis** et 1 **Rossignol siffleur** qui sera seulement entendu (chante une strophe seulement).

Nous devons ensuite partir en direction de l'aéroport pour prendre notre avion nous menant à Bichkek, capitale du Kirghizistan. Arrivés sur place, nous avons une bonne dizaine d'heures à tuer avant de reprendre l'avion aussi nous décidons de nous promener autour de l'aéroport.

Au total, nous parviendrons à observer 37 espèces parmi lesquelles : la **Tourterelle orientale**, l'**Engoulevent d'Europe** (très belle observation d'un individu posé en plein jour), le **Rollier d'Europe**, l'**Hirondelle pâle**, la **Mésange azurée**, le **Pouillot de Hume**, le **Pouillot verdâtre**, le **Pouillot boréal**, la **Rousserolle des buissons**, de très nombreuses **Fauvettes babillardes**, l'**Etourneau roseli**n, le **Martin triste**, la très jolie **Bergeronnette grise ssp. *personata*** et 1 magnifique mâle rouge de **Roselin cramoisi**. C'est avec ces dernières observations kirghizes que se termine notre séjour ornithologique.



Environs du camp Munkhtenger. © Willy Raitière

Liste commentée des espèces observées par ordre systématique

Au total, ce sont 223 espèces qui ont été observées.

Oie à tête barrée *Anser indicus* Bar-headed Goose LC

Observée sur 3 sites seulement : 2 sur le lac de Sangin Dalaï et 3 dans un petit marais plus au nord le 26/08 puis environ 95 à Elsen Tasarkhaï le 28/08.

Oie cygnoïde *Anser cygnoides* Swan Goose EN

11 en vol le 20/08 au-dessus de la rivière Khurkh à proximité du camp de yourtes Chinggis Toonot ; 55 le même jour sur une lagune de la vallée de la rivière Khurkh (48.5191245°N / 110.4696248°E) ; 2 à Sangin Dalaï le 26/08 puis une cinquantaine sur le lac Ogi le 27/08.

Oie des moissons *Anser fabalis* Bean Goose LC

1 en vol le 27/08 à l'extrémité ouest du lac Ogi.

Cygne de Bewick *Cygnus columbianus bewickii* Bewick's Swan NE

1 le 27/08 à l'extrémité ouest du lac Ogi.

Cygne chanteur *Cygnus cygnus* Whooper Swan LC

Observé sur la plupart des zones humides prospectées. Notamment 14 le 19/08 à Gun Galutaï.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* Common Shelduck LC

7 le 19/08 à Gargal Tkhan ; 20 le 26/08 à Sangin Dalaï ; 5 le 27/08 sur le lac Ogi ; 300 le 29/08 sur le lac Bayan.

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* Ruddy Shelduck LC

Observé sur la plupart des zones humides prospectées, parfois en grand nombre. Notamment 300 le 27/08 sur le lac Ogi.

Sarcelle d'été *Spatula querquedula* Garganey LC

Observé sur 4 sites : 2 à Sum Kurkh Burd le 23/08, 10 sur la lac Ogi le 27/08, 2 à Elsen Tasarkhaï le 28/08 et 2 dans les marais d'Oulan Bator le 29/08.

Canard souchet *Spatula clypeata* Shoveler LC

Observé sur 5 sites : 3 à Gargal Tkhan le 19/08, sur le lac de Binder le 20/08, 10 à Gun Galutaï le 22/08, à Sangin Dalaï le 26/08 puis sur le lac Bayan le 29/08.

Canard chipeau *Mareca strepera strepera* Gadwall LC

Observé sur 5 sites : sur le lac de Binder le 20/08, à Sangin Dalaï le 26/08, sur le lac Ogi le 27/08 puis sur le lac Bayan et les marais d'Oulan Bator le 29/08.

Canard siffleur *Mareca penelope* Eurasian Wigeon LC

Observé sur 3 sites seulement : 1 à Gun Galutaï le 22/08, à Sangin Dalaï le 26/08, 60 au lac Ogi le 27/08, 2 à Elsen Tasarkhaï le 28/08 puis dans les marais d'Oulan Bator le 29/08.

Canard de Chine *Anas zonorhyncha* Chinese spot-billed Duck LC

Observé uniquement sur le plan d'eau d'Elsen Tasarkhaï le 28/08. Les 4 individus observés se tenaient en limite de roselière.



Canard de Chine © Hugo Touzé

Canard colvert *Anas platyrhynchos platyrhynchos* Mallard LC

Commun dans tous les marais et sur tous les plans d'eau du pays. Les effectifs sont en revanche rarement supérieurs à la centaine d'individus.

Canard pilet *Anas acuta* Pintail LC

13 le 26/08 à Sangin Dalaï, 20 sur le lac Ogi le 27/08 puis le 29/08 dans les marais d'Oulan Bator.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* Eurasian Teal LC

Commune, observée sur la plupart des zones humides. L'effectif maximum observé est de 50 oiseaux le 22/08 à Gun Galutaï.

Nette rousse *Netta rufina* Red-crested Pochard LC

8 oiseaux de type femelle posés sur le lac Ogi le 27/08 puis sur le lac Bayan le 29/08.

Fuligule milouin *Aythya ferina* Common Pochard VU

Observé le plus souvent en petit nombre sur de nombreuses zones humides. Le plus gros groupe rassemblait 25 oiseaux sur le lac Ogi le 27/08.

Fuligule morillon *Aythya fuligula* Tufted Duck LC

Observé sur de nombreuses zones humides, avec des effectifs faibles le plus souvent (moins de 10 individus).

Macreuse à ailes blanches *Melanitta deglandi stejnegeri* White-winged Scoter NE

Un seul jeune mâle observé le 22/08 à Gun Galutaï.

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula clangula* Common Goldeneye LC

Espèce commune observée sur tous les plans d'eau. Les rassemblements sont parfois importants. Par exemple, environ 350 oiseaux étaient à Gun Galutaï le 19/08 et 300 au même endroit le 22/08.

Harle piette *Mergellus albellus* Smew LC

1 femelle sur le lac Ogi le 27/08.

Harle bièvre *Mergus merganser* Goosander LC

4 individus de type femelle sur un bras de la rivière Tula le 29/08.

Perdrix choukar *Alectoris chukar* Chukar LC

Noté uniquement dans la vallée d'Ongi, avec d'importants groupes familiaux rassemblant parfois une vingtaine d'individus de tous les âges.



Perdrix choukar © Willy Raitière

Caille des blés ou Caille du Japon *Coturnix coturnix/japonica* Common/Japanese Quail NT

1 oiseau levé au bord d'un champ cultivé au nord-est d'Umnudelger le 21/08.

Plongeon arctique *Gavia arctica arctica* Black-throated Loon LC

1 observé à Sangin Dalaï le 26/08 et 1 sur le lac Ogi le 27/08.

Grèbe huppé *Podiceps cristatus cristatus* Great Crested Grebe LC

Observé sur la plupart des plans d'eau. Espèce commune.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus auritus* Slavonian Grebe VU

Observé à Binder le 20/08, à Sangin Dalaï le 26/08, sur le lac Ogi le 27 et le 28/08 (une 15ne d'individus) puis dans les marais d'Oulan Bator le 29/08.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis nigricollis* Black-necked Grebe LC

Egalement observé un peu partout : Gun Galutaï, Binder, Sangin Dalaï et lac Ogi.

Cigogne noire *Ciconia nigra* Black Stork LC

1 le 20/08 dans la vallée de la rivière Khurkh, 2 le 21/08 dans la vallée de la rivière Khurkh, 4 à Elsen Tasarkhaï le 28/08 et 1 à proximité du camp Bayan Gobi le 29/08.

Spatule blanche *Platalea leucorodia leucorodia* Eurasian Spoonbill LC

2 sur une lagune (46.0053807°N / 103.5267107°E) dans la steppe au sud de Sangin Dalaï le 26/08, 50 à Sangin Dalaï le 26/08, 1 à une trentaine de kilomètre au nord de Kharkhorin le 26/08, 90 au lac Ogi le 27/08 et notée à Elsen Tasarkhaï le 28/08.

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax nycticorax* Black-crowned Night Heron LC

1 oiseau de première année dans un orme dans la vallée d'Ongi les 24 et 25/08.

Héron cendré *Ardea cinerea cinerea* Grey Heron LC

Observé un peu partout sur les zones humides. Maximum noté : 100 sur l'ensemble du lac Ogi le 27/08.

Grande Aigrette *Ardea alba alba* Great Egret LC

4 le 27/08 au lac Ogi.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo sinensis* Great Cormorant LC

Observé un peu partout sur les zones humides. Maximum noté : 300 au lac Ogi le 27/08.

Gypaète barbu *Gypaetus barbatus barbatus* Bearded Vulture NT

1 dans la vallée d'Ongi le 25/08 et 2 dans une vallée au sud de Sangin Dalaï (46.5747737°N / 103.2481779°E) le 26/08.

Bondrée apivore *Pernis apivorus* European Honey Buzzard LC

1 près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Bondrée orientale *Pernis ptilorhynchus orientalis* Crested honey Buzzard LC

1 dans la vallée d'Ongi le 24/08, un groupe de 4 et un groupe de 23 au même endroit le 25/08, 1 au même endroit le 26/08 et 1 mâle très bien observé en vol dans la steppe entre la vallée d'Ongi et Sangin Dalaï (45.911798°N / 103.5909453°E) le 26/08.



Bondrée orientale © Willy Raitière

Vautour de l'Himalaya *Gyps himalayensis* Himalayan Vulture NT

Observé à deux reprises seulement : 1 posé dans une vallée au sud de Sangin Dalaï (46.5747737°N / 103.2481779°E) le 26/08 et 1 en vol à Elsen Tasarkhaï le 28/08. Il s'agit du pendant asiatique du Vautour fauve. Le plumage des 2 espèces est très similaire.

Vautour moine *Aegypius monachus* Cinereous Vulture NT

Il s'agit du rapace le plus souvent noté. Il est présent partout, aussi bien dans la steppe qu'autour des zones humides. Observé le plus souvent en vol mais également parfois posé sur des cadavres de bétail.

Aigle criard *Clanga clanga* Greater spotted Eagle VU

1 seul individu observé en vol distant dans une vallée au sud de Sangin Dalaï (46.5747737°N / 103.2481779°E) le 26/08.

Aigle botté *Hieraaetus pennatus* Booted Eagle LC

Observé dès notre arrivée le 18/08 à l'aéroport d'Oulan Bator. Bien présent dans la vallée d'Ongi avec des oiseaux de tous les plumages (jusqu'à 7 individus différents) et de très belles observations du 23 au 26/08. Egalement 1 individu au lac Ogi le 27/08.

Aigle des steppes *Aquila nipalensis nipalensis* Steppe Eagle EN

Egalement très abondant un peu partout. Des oiseaux de tous les âges ont été observés, parfois dans de très bonnes conditions.

Aigle impérial *Aquila heliaca* Eastern imperial Eagle VU

1 seul individu observé : le 22/08 en vol au-dessus d'une station essence à Zuunmod (47.7025668°N / 106.9464531°E).



Aigle des steppes © Willy Raitière

Aigle royal *Aquila chrysaetos* Golden Eagle LC

1 à Bogt Khan le 18 et 19/08, 1 dans la vallée de la rivière Khurkh le 21/08, 1 au sud de Bogt Khan (47.3959619°N / 106.7139458°E) le 22/08 et 1 entre le camp Bayan Bulag et la vallée d'Ongi (45.8113736°N / 104.5963969°E) le 23/08.

Epervier du Japon *Accipiter gularis sibiricus* Japanese Sparrowhawk LC

1 mâle dans la vallée d'Ongi les 24 et 25/08.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus nisosimilis* Eurasian Sparrowhawk LC

1 à Bogt Khan le 18/08, 1 au camp « Steppe Nomads » le 22/08, 1 non loin de Sum Khurkh Burd le 23/08, 1 dans la vallée d'Ongi le 23 et le 25/08.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus aeruginosus* Western Marsh Harrier LC

1 sur la lagune de Binder le 20/08.

Busard d'Orient *Circus spilonotus* Eastern Marsh Harrier LC

6 sur une lagune de la vallée de la rivière Khurkh le 20/08, au moins 2 à Sum Khurkh Burd le 23/08, 2 à Sangin Dalaï le 26/08, 3 à Elsen Tasarkhaï le 28/08 et au lac Bayan le 29/08.

Les mâles et les femelles (rappellent le Busard Saint-Martin) adultes sont assez faciles à différencier du Busard des roseaux mais les juvéniles posent davantage de problèmes, d'autant que les illustrations de certains guides (« Birds of Eastern Asia » et « Birds of Central Asia ») sont assez approximatives, voire erronées. Les juvéniles peuvent être séparés des Busard des roseaux du même âge par leur croupion largement pâle (plus pâle que les parties supérieures) et les rémiges primaires à base pâle, ce qui forme une grande plage blanchâtre à la base des rémiges primaires sous l'aile, contrastant avec les rémiges secondaires sombres. Notons que les illustrations des guides cités montrent un pattern de la tête qui n'est pas conforme à ce que nous avons observé sur le terrain pour les oiseaux juvéniles. Les oiseaux

de l'année montrent un motif proche de celui des jeunes Busard des roseaux, avec des plages de couleur fauve sur la calotte et la gorge.

Milan brun *Milvus migrans lineatus* Black-eared Kite LC

Commun et observé partout. Les oiseaux observés sont pour la plupart des oiseaux de l'année. Maximums observés : 30 à Bogt Khan le 19/08 et 25 au lac Ogi le 27/08 mais également un dortoir de plusieurs dizaines (centaines ?) d'oiseaux le long de la rivière Thula à Oulan Bator le 29/08. Quelques Milans noirs *Milvus migrans migrans* près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla albicilla* White-tailed Eagle LC

1 au bord de la rivière Khurkh à proximité du camp Chinggis Toonot le 20/08 et 2 le lendemain au même endroit.



Milan brun © Willy Raitière

Buse de Chine *Buteo hemilasius* Upland Buzzard LC

Observé à l'unité de manière très régulière un peu partout. Particulièrement nombreuses à Sangin Dalaï le 26/08.

Buse du Japon *Buteo japonicus japonicus* Eastern Buzzard LC

1 en vol à proximité de Gargal Tkhan le 19/08.

Buse féroce *Buteo rufinus rufinus* Long-legged Buzzard LC

1 au camp de la vallée d'Ongi le 24/08.

Buse des steppes *Buteo buteo vulpinus* Steppe Common Buzzard LC

11 oiseaux en migration dans la vallée d'Ongi le 25/08.

Râle à joue brune *Rallus indicus* Eastern Water Rail LC

1 individu au lac Bayan le 29/08. L'observation ayant été furtive il n'a pas été possible d'exclure le Râle d'eau (*Rallus aquaticus*) cependant l'aire de répartition de ce dernier est plus occidentale.

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus chloropus* Common Moorhen LC

4 le 28/08 à Elsen Tasarkhaï et quelques-unes près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Foulque macroule *Fulica atra atra* Eurasian Coot LC

Observé sur de nombreuses zones humides : Gun Galutaï (une cinquantaine), Binder, Sangin Dalaï, lac Ogi (une centaine), Elsen Tasarkhaï, marais d'Oulan Bator et lac Bayan.

Grue de Sibérie *Leucogeranus leucogeranus* Siberian Crane

CR

1 individu en compagnie de 2 Grues à cou blanc sur une lagune (48.4599901°N / 110.3157072°E) dans la vallée de la rivière Khurkh.

Grue à cou blanc *Antigone vipio* White-naped Crane

VU

Observée principalement entre le 19 et le 21/08 dans la vallée de la rivière Khurkh. Au total, une quinzaine d'individus (dont des familles) ont été observés le 20/08. Une seule observation en dehors de cette zone : 3 individus le 28/08 à Elsen Tsarkhaï.



Grue de Sibérie © Hugo Touzé

Grue demoiselle *Grus virgo* Demoiselle Crane LC

Observée tout au long du voyage, dans les zones de steppes. Les plus gros effectifs sont observés dans la vallée de la rivière Khurkh où sans doute un millier d'oiseaux stationnait le 20/08 (48.2921162°N / 110.2112248°E).

Grue cendrée *Grus grus* Common Crane LC

Une quinzaine au total le 20/08 dans la vallée de la rivière Khurkh. Observée également le 21/08 dans la même zone (25 individus).

Échasse blanche *Himantopus himantopus* Black-winged Stilt LC

Observée sur plusieurs lagunes : Gargal Tkhan et Gun Galutaï le 19/08, Binder le 20/08, Gun Galutaï le 22/08 (une dizaine d'individus) puis Sangin Dalaï le 26/08.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* Pied Avocet LC

Observée sur 6 sites : Gargal Tkhan et Gun Galutaï le 19/08, Sangin Dalaï et sur une lagune dans le nord Gobi (45.9333681 °N / 103.5758789°E) le 26/08, sur le lac Ogi le 27/08 puis sur le lac Bayan le 29/08.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* Northern Lapwing NT

Observés sur de nombreuses zones humides tout au long du séjour : lagunes, marais, prairies humides…

Pluvier fauve *Pluvialis fulva* Pacific golden Plover LC

240 à Gun Galutaï le 19/08, 2 près du camp Chinggis Toonot le 21/08, 1 à Gun Galutaï le 22/08, 50 sur une lagune du nord Gobi le 26/08 puis 550 sur le lac Ogi le 27/08. Les effectifs variant fortement d'un jour à l'autre laissent penser que nous étions dans le pic de passage de l'espèce.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola squatarola* Grey Plover VU

1 le 22/08 à Gun Galutaï et 2 le 29/08 au lac Bayan.

Petit Gravelot *Charadrius dubius* Little ringed Plover LC

Observé sur de nombreux sites : Gun Galutaï, Sum-Khurkh Burd, vallée d'Ongi, Sangin Dalaï, lac Ogi et lac Bayan.

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* Kentish Plover LC

2 le 19/08 à Gun Galutaï, 1 le 22/08 au même endroit puis 1 au lac Ogi le 27/08.

Courlis nain *Numenius minutus* Little Curlew LC

Une des espèces phares du séjour. 2 oiseaux le 21/08 non loin du camp Chinggis Toonot (48.528415°N / 110.7198124°E) dans un groupe de Vanneaux huppés et Barges à queue noire, 6 individus au moins le 27/08 autour du lac Ogi : 2 sur la lagune à l'est du lac et 4 dans les prairies inondées de la partie ouest.

Courlis cendré *Numenius arquata suschkini* Eurasian Curlew NT

1 à Gargal Tkhan le 19/08, 3 à Sangin Dalaï le 26/08 et 2 au lac Ogi le 27/08.



Courlis nain
© Hugo Touzé

Barge à queue noire *Limosa limosa* Black-tailed Godwit

NT

Des groupes ont été observés un peu partout sur les diverses zones humides prospectées, y compris en halte sur des prairies humides de la steppe. Un groupe d'environ 80 individus a été observé dans la steppe non loin du camp Chinggis Toonot le 21/08, un groupe d'environ 40 individus au lac Ogi le 27/08 et environ 50 individus sur la lagune située à l'est du lac Ogi le 28/08.



Barges à queue noire © Willy Raitière

Tournepierre à collier *Arenaria interpres interpres* Ruddy Turnstone

NT

2 à Gun Galutaï le 19/08, 1 sur une lagune de la vallée de la rivière Khurkh le 20/08, 2 à Gun Galutaï le 22/08, 8 au lac Ogi le 27/08 et 3 au même endroit le 28/08.

Combattant varié *Calidris pugnax* Ruff LC

2 à Gun Galutaï le 22/08, 3 à Sum Khurkh Burd le 23/08 4 à Sangin Dalaï le 26/08, 15 au lac Ogi le 27/08 et 8 le lendemain au même endroit.

Bécassseau falcinelle *Calidris falcinellus sibirica* Broad-billed Sandpiper VU

10 à Gun Galutaï le 22/08, 5 àSum Khurkh Burd le 23/08, 1 à Sangin Dalaï le 26/08, 2 au lac Ogi le 27/08 et 3 sur la lagune est du lac Ogi le 28/08.

Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata* Sharp-tailed Sandpiper VU

5 à Gun Galutaï le 19/08, 1 sur la lagune de Binder le 20/08, 4 à Gun Galutaï le 22/08, 3 à Sangin Dalaï le 26/08, 10 au lac Ogi le 27/08, 3 sur la lagune est du lac Ogi le 28/08 et 1 au lac Bayan le 29/08.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* Curlew Sandpiper VU

1 à Gargal Tkhan le 19/08, 10 à Gun Galutaï le 19 et le 21/08, 1 sur une zone humide de la vallée de la rivière Khurkh le 20/08, 90 au lac Ogi le 27/08. Présent également le 28/08 sur la lagune est du lac Ogi.

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* Temminck's Stint LC

Observé de manière régulière sur les lagunes prospectées. Notons notamment une vingtaine d'individus le 27/08 au lac Ogi.

Bécasseau à longs doigts *Calidris subminuta* Long-toed Stint LC

5 à Gun Galutaï le 22/08, 6 à Sum Khurkh Burd le 23/08, 5 à Sangin Dalaï le 26/08, 30 au lac Ogi le 27/08, 5 sur la lagune est du lac Ogi le 28/08 puis 1 au lac Bayan le 29/08.

Bécasseau à cou roux *Calidris ruficollis* Red-necked Stint NT

4 à Gun Galutaï le 19/08, 1 sur la lagune de Binder le 20/08, 10 à Gun Galutaï le 21/08, 6 au lac Ogi le 27/08, 2 sur la lagune est du lac Ogi le 28/08.

Bécasseau sanderling *Calidris alba rubida* Sanderling LC

2 le 27/08 au lac Ogi.

Bécasseau variable *Calidris alpina centralis* Dunlin NT

4 le 27/08 au lac Ogi.

Bécasseau minute *Calidris minuta* Little Stint LC

Présent un peu partout et régulièrement dans des effectifs importants. Par exemple, une centaine d'individus étaient le 27/08 au lac Ogi et une trentaine au lac Ogi le 19 et le 22/08.

Bécassine à queue pointue *Gallinago stenura* Pin-tailed Snipe LC

1 à Bogt Khan le 18/08, 7 à Gun Galutaï le 22/08, plusieurs à Sum Khurkh Burd le 23/08, 10 dans la vallée d'Ongi le 25/08 et 2 à Sangin Dalaï le 26/08.

Bécassine de Swinhoe *Gallinago megala* Swinhoe's Snipe LC

Aucun individu n'a été identifié formellement, cependant, plusieurs bécassines ont été bien observées en comparaison directe avec des Bécassines des marais/à queue pointue et étaient très distinctement plus imposantes, plus sombres et avec un bec proportionnellement plus court et épais à la base. Le site de Sum Khurkh Burd était en particulier très favorable à l'observation des bécassines (en vol principalement) et il est très probable que les 3 espèces de bécassines y étaient présentes.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago gallinago* Common snipe LC

Observée régulièrement tout au long du séjour. Une cinquantaine d'individus a été dénombré le 27/08 autour du lac Ogi.

Chevalier bargette *Xenus cinereus* Terek Sandpiper LC

2 à Gargal Tkhan le 19/08, 2 à Gun Galutaï le même jour, 1 à Sangin Dalaï le 26/08, 2 au lac Ogi le 27/08 et 2 sur la lagune située à l'est du lac Ogi le 28/08.

Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus* Red-necked Phalarope LC

9 à Gun Galutaï le 19/08, 3 sur une lagune de la vallée de la rivière Khurkh le 20/08, 7 à Gun Galutaï le 22/08, 27 à Sangin Dalaï le 26/08, 65 sur le lac Ogi le 27/08, 5 sur la lagune à l'est du lac Ogi le 28/08 et enfin 2 sur le lac Bayan le 29/08.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* Common Sandpiper LC

Observé un peu partout, le plus souvent en petits effectifs mais tout de même une dizaine le 22/08 à Gun Galutaï et une vingtaine autour du lac Ogi le 27/08.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* Green Sandpiper LC

Egalement observé ponctuellement sur de nombreuses zones humides. Effectif maximum noté : 5 autour du lac Ogi le 27/08.

Chevalier de Sibérie *Tringa brevipes* Grey-tailed Tattler LC

1 à Gun Galutaï le 19/08 et 1 dans la vallée de la rivière Khurkh (48.5191245°N / 110.4696248°E) le 20/08.



Chevalier de Sibérie © Willy Raitière

Chevalier gambette *Tringa totanus ussuriensis* Common Redshank LC

1 à Gargal Tkhan le 19/08, 4 sur une lagune de la vallée de la rivière Khurkh le 20/08, 2 à Gun Galutaï le 22/08, 1 à Sum Kurkh Burd le 23/08, à Sangin Dalaï le 26/08, 10 au lac Ogi le 27/08 et 5 sur la lagune est du lac Ogi le 28/08.

Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* Marsh Sandpiper LC

5 à Gun Galutaï le 19/08, 3 à Gun Galutaï le 22/08 et 3 au lac Ogi le 27/08.

Chevalier sylvain *Tringa glareola* Wood Sandpiper LC

Sans doute le limicole le plus présent du séjour. Observé sur chaque zone humide, y compris sur des flaques temporaires dans la steppe. On notera notamment environ 200 individus au lac Ogi le 27/08.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* Spotted Redshank LC

Présent un peu partout. En particulier, 70 individus observés sur l'ensemble du lac Ogi le 27/08.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* Common Greenshank LC

Observé de manière régulière tout au long du séjour mais en petits effectifs (moins de 10 individus).

Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* Black-headed Gull LC

Observée sur la plupart des zones humides tout au long du séjour.

Goéland ichthyaète *Ichthyaetus ichthyaetus* Pallas's Gull LC

Une dizaine sur le lac Ogi devant le camp de yourtes le 26/08, 35 sur le lac Ogi le 27/08 et 1 sur la lagune située à l'est du lac Ogi le 28/08.

Goéland de la Véga *Larus vegae mongolicus* Vega Gull NE

Observé à Gargal Tkhan, Gun Galutaï, dans la vallée de la rivière Khurkh, à Sangin Dalaï et sur le lac Ogi.

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* Common Tern LC

5 observées sur la rivière Thula le 18/08 puis sur la plupart des zones humides visitées (Gun Galutaï, vallée de la rivière Khurkh, camp « Steppe Nomads », Sangin Dalaï, lac Ogi et Elsen Tasarkhaï). Certains individus présentent toutes les caractéristiques de la sous-espèce *longipennis* mais certains sont très proches du phénotype des oiseaux européens.

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* White-winged black Tern LC

2 à Gun Galutaï le 19/08, une 10ne le 20/08 dans la vallée de la rivière Khurkh, 5 à Gun Galutaï le 22/08, 50 sur le lac Ogi le 27/08 et 2 dans les marais d'Oulan Bator le 29/08.

Syrrhapte paradoxal *Syrrhaptes paradoxus* Pallas's Sandgrouse LC

Observé uniquement dans le désert de Gobi. Les premiers ont été observés le 22/08 au nord du camp Bayan Bulag (46.2601071°N / 106.1646438°E). De grands groupes de plusieurs centaines d'oiseaux ont été observés au nord de la vallée d'Ongi, à partir du point 45.5071467°N / 103.9524462°E. Au total, sur ce secteur le 23/08, ce sont plus de 1.000 individus qui ont été observés. De grands groupes ont également été observés en vol dans la vallée d'Ongi. Ainsi, au moins 580 individus y ont été vus le 24/08.



Syrrhapte paradoxal © Willy Raitière

Pigeon biset domestique *Columba livia livia* Feral Pigeon LC

Des groupes notés dans de nombreuses villes et villages ainsi que le 30/08 près de l'aéroport de Bichkek.

Pigeon des rochers *Columba rupestris rupestris* Hill Pigeon LC

1 sur la route menant à Oulan Bator (47.7143833°N / 107.8024697°E) le 22/08 et au moins 2 dans un groupe de Pigeon bisets domestiques à Ongi le 24 et 25/08.



Pigeon des rochers © Willy Raitière

Pigeon ramier *Columba palumbus casiotis* Common Wood Pigeon LC

Uniquement observé près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur arenicola* European Turtle Dove VU

2 observées près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Tourterelle orientale *Streptopelia orientalis orientalis/meena* Oriental Turtle Dove LC

6 observées à Bogt Khan le 19/08, 5 sur les bords de la rivière Khurkh, près du camp Chinggis Toonot le 21/08, 2 dans la vallée d'Ongi le 24/08 et 2 au même endroit le 25/08, 1 près de l'aéroport de Bichkek le 30/08. Observée le plus souvent en vol, assez farouche. Il n'a pas été possible de déterminer avec certitude la sous-espèce des oiseaux observés mais certains semblent montrer des rectrices à pointes blanches, ce qui en ferait des oiseaux de la sous-espèce *meena*.

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto decaocto* Eurasian collared dove LC

1 dans le village de Sangiindalaï le 23/08, observée dans la vallée d'Ongi du 23 au 26/08 (jusqu'à 5 individus) puis au camp Bayan Gobi les 28 et 29/08, 2 près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Coucou oriental *Cuculus optatus* Oriental Cuckoo LC

1 juvénile de forme rousse est observé et photographié le 25/08 dans la vallée d'Ongi et 1 probable le 30/08 dans la taïga près du camp Munkhtenger.

Coucou gris/oriental *Cuculus canorus/optatus* Oriental/Common Cuckoo LC

1 dans la vallée d'Ongi le 24/08 puis 2 au même endroit le 25/08.



Coucou oriental © Willy Raitière

Grand-Duc d'Europe *Bubo bubo yenisseensis* Eurasian Eagle-owl LC

2 sur les bords de la rivière Khurkh près du camp Chinggis Toonot le 21/08, 1 au camp Bayan Bulag le 22/08, 1 dans la vallée d'Ongi le 24/08 et 1 entendu dans les dunes d'Elsen Tasarkhaï le 28/08.

Chevêche d'Athéna *Athene noctua plumipes* Little Owl LC

Observée uniquement dans le Gobi, sur les constructions en pierre ou les zones rocheuses : 2 à une cinquantaine de kilomètres au nord-est du camp Bayan Bulag et 3 au camp Bayan Bulag le 22/08, 1 dans la vallée d'Ongi le 24 et 25/08.

Hibou moyen-duc *Asio otus otus* Long-eared Owl LC

1 dans la taïga à côté du camp Munkhtenger le 30/08.

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* European Nightjar LC

1 dans la vallée d'Ongi le 23/08 et 1 près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.



Engoulevent d'Europe
© Willy Raitière

Martinet noir *Apus apus pekinensis* Common Swift LC

1 à Gargal Tkhan le 19/08, 1 au camp « Steppe nomads » le 22/08 et 15 dans la vallée d'Ongi le 24/08. Egalement observé le 30/08 près de l'aéroport de Bichkek.

Martinet de Sibérie *Apus pacificus* Pacific Swift LC

5 devant le camp Bayan Bulag le 22/08 et 2 non loin de ce même camp le 23/08.

Rollier d'Europe *Coracias garrulus semenowi* European Roller LC

2 près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* Common Kingfisher LC

Observé uniquement le long de la rivière Khurkh, à côté du camp Chinggis Toonot le 20 (1 individu) et 21/08 (2 individus). Un nid y a été observé, creusé dans une rive sableuse et abrupte. Au moins 1 individu près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Huppe fasciée *Upupa epops epops* Eurasian Hoopoe LC

Observée ponctuellement çà et là, tout au long du séjour. Assez nombreuses le 27/08 autour du lac Ogi (une dizaine d'oiseaux au total).

Torcol fourmilier *Jynx torquilla chinensis* Eurasian Wryneck LC

1 à Bogt Khan le 18/08, 1 dans la vallée d'Ongi le 24/08 et 2 au même endroit le 25/08. 1 près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Pic épeichette *Dryobates minor kamtschatkensis* Lesser spotted Woodpecker LC

2 sur les bords de la rivière Thula le 18/08, 2 le long de la rivière Khurkh, à côté du camp Chinggis Toonot le 20 et 21/08.

Pic épeiche *Dendrocopos major brevirostris* Great spotted Woodpecker LC

1 à Bogt Khan le 19/08, 1 près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Pic à dos blanc *Dendrocopos leucotos* White-backed Woodpecker LC

1 sur les bords de la rivière Thula le 29/08 et 1 dans la taïga à côté du camp Munkhtenger le 30/08.



Pic à dos blanc © Hugo Touzé

Pic noir *Dryocopus martius martius* Black Woodpecker LC

1 à Bogt Khan le 19/08 et 2 le long de la rivière Khurkh, à côté du camp Chinggis Toonot le 21/08.

Pic cendré *Picus canus jessoensis* Grey-headed Woodpecker LC

Observé uniquement le long de la rivière Khurkh, à côté du camp Chinggis Toonot le 20 et 21/08.

Faucon crécerellette *Falco naumanni* Lesser Kestrel LC

Observé uniquement dans la vallée d'Ongi et ses environs entre le 23 et le 25/08. Un gros dortoir mixte rassemblant 150 à 200 Faucons crécerelles et crécerellettes est établi dans les ormes le long de la piste en arrivant au camp de la vallée d'Ongi. Un comptage nocturne nous a permis d'établir un ratio de 2 à 3 crécerellettes pour 1 crécerelle sur ce dortoir.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus perpallidus* Common Kestrel LC

Un dortoir d'environ une dizaine d'individu est détecté aux environs de Bogt Khan le 18/08. L'espèce est ensuite observée quasi quotidiennement.

Faucon de l'Amour *Falco amurensis* Amur Falcon LC

Essentiellement observé dans la partie nord de l'itinéraire parcouru, en particulier autour de la rivière Thula dès le 18/08 où des individus sont observés transportant des proies vers leurs sites de nid. D'autres sont observés ensuite régulièrement par petits groupes comptant jusqu'à une dizaine d'individus sur des fils le long de la piste menant au camp Chinggis Toonot, notamment autour du village d'Umnudelger.

Faucon émerillon *Falco columbarius pallidus* Merlin LC

1 mâle à Umnudelger le 19/08 et le 21/08, 1 au lac Bayan le 29/08.

Faucon hobereau *Falco subbuteo* Eurasian Hobby

LC

2 à Bogt Khan le 18/08, 1 au camp Chinggis Toonot le 20/08, 1 dans la vallée d'Ongi le 25/08 et 1 au camp Munkhtenger le 30/08, 3 près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Faucon sacre *Falco cherrug coatsi* Saker Falcon

EN

Très souvent observé, et parfois dans de très bonnes conditions (posés sur des poteaux ou en vol). Des groupes (familiaux ?) sont observés le 18 et 19/08 à Bogt Khan (6 individus ensemble). L'espèce est également très présente à Sangin Dalaï le 26/08 (une dizaine d'individus).



Faucon sacre © Willy Raitière

Faucon pèlerin *Falco peregrinus calidus* Peregrine Falcon LC

2 dans la vallée d'Ongi le 24/08 et 1 dans une vallée au sud de Sangin Dalaï (46.5747737°N / 103.2481779°E).

Pie-grièche brune *Lanius cristatus* Brown Shrike LC

Commune partout, y compris au milieu de la steppe. Observée presque tous les jours.

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* Red-backed Shrike LC

1 près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Pie-grièche isabelle *Lanius isabellinus* Isabelline Shrike LC

3 dans la vallée d'Ongi le 24 et 2 au même endroit le 25/08.

Pie-grièche des steppes *Lanius pallidirostris* Steppe Grey Shrike NE

1 sur une piste dans la zone montagneuse avant d'arriver au camp de la vallée d'Ongi le 24/08

Geai des chênes *Garrulus glandarius brandtii* Eurasian jay LC

Observé uniquement le long de la rivière Khurkh, à côté du camp Chinggis Toonot le 20 (1 individu) et 21/08 (2 individus).

Pie bleue *Cyanopica cyanus cyanus* Azure-winged Magpie LC

9 individus (et un nid) le 18/08 le long de la rivière Thula et de beaux groupes le long de la rivière Khurkh, à côté du camp Chinggis Toonot, avec notamment environ 115 individus quittant leur dortoir le 21/08. Le spectacle était superbe !

Pie bavarde *Pica pica* Eurasian Magpie LC

Observée presque tous les jours mais principalement aux alentours des constructions humaines pérennes. Maximum noté : 15 à Bayan Gobi le 29/08 et 10 le long de la rivière Thula le 29/08. Observée également près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Podoce de Henderson *Podoces hendersoni* Henderson's ground Jay LC

2 dans les zones vallonnées (45.3715081 °N / 103.993227 °E) quelques kilomètres avant le camp de la vallée d'Ongi le 24/08, 2 individus le lendemain au même endroit et 3 individus un peu plus à l'est également le 25/08. Très belles observations de cette espèce si particulière.



Podoce de Henderson © Hugo Touzé

Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos* Spotted Nutcracker LC

5 à Bogt Khan le 18/08 et une vingtaine au même endroit le 19/08.

Crave à bec rouge *Pyrrhocorax pyrrhocorax* Red-billed Chough LC

Observé de manière très régulière tout au long du séjour, dès que des zones rocheuses sont présentes. Les groupes rassemblent régulièrement plusieurs dizaines d'individus. A noter 2 individus utilisant comme dortoir nocturne le kiosque du camp de yourtes du lac Ogi.

Choucas de Daourie *Coloeus dauuricus* Daurian Jackdaw NE

Observé dès le premier jour (4 individus le 18/08) le long de la rivière Thula. Les groupes les plus impressionnants seront observés dans la vallée de la rivière Khurkh le 21/08 (48.4688599°N / 110.6629416°E) où plusieurs milliers (estimation de 6.500 individus) d'oiseaux étaient rassemblés autour des troupeaux. Nous avons pu observer des oiseaux de tous les âges. Les oiseaux de première année avaient déjà commencé leur mue post-juvénile et présentaient un plumage bariolé avec déjà une grande quantité de plumes gris pâle. Aucun juvénile entièrement sombre n'a été observé.



Choucas de Daourie © Willy Raitière

Corbeau freux *Corvus frugilegus pastinator* Eastern Rook LC

Observé dans la partie nord de l'itinéraire, autour d'Oulan Bator, dans la vallée de la rivière Khurkh et au lac Ogi. L'effectif maximum noté est d'une centaine d'individus près d'une ferme au lac Ogi le 27/08.

Corneille noire orientale *Corvus (corone) orientalis* Oriental Crow LC

Observée autour d'Oulan Bator ainsi qu'au camp Bayan Gobi. Observée également près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Grand Corbeau *Corvus corax* Northern Raven LC

Commun et présent dans tous les types d'habitats.

Mésange noire *Periparus ater rufipectus* Coal Tit LC

Observée uniquement à Bogt Khan le 18 et 19/08 avec une dizaine d'individu dans la taïga.

Mésange boréale *Poecile montanus baicalensis* Willow Tit LC

Observée à Bogt Khan le 18 et 19/08 (une dizaine d'individus) ainsi qu'autour du camp de Chinggis Toonot le 20 et 21/08.

Mésange charbonnière *Parus major* Northern Great Tit LC

2 dans la ripisylve de la rivière Thula à Oulan-Bator le 18/08, 1 à Bogt Khan le 18 et 19/08, dans la ripisylve de la rivière Khurkh autour du camp Chinggis Toonot le 20 et 21/08 et dans la taïga du camp Munkhtenger le 30/08. Les oiseaux observés semblent plus pâles que les oiseaux ouest européens. Observée également près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Mésange azurée *Cyanistes cyanus yenisseensis* Azure Tit

LC

Une douzaine le long de la rivière Thula à Oulan Bator le 29/08. Plusieurs individus observés également près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.



Mésange azurée © Hugo Touzé

Rémiz couronnée *Remiz coronatus stoliczkae* White-crowned Penduline Tit

LC

1 dès le 18/08 dans la ripisylve de la rivière Thula à Oulan Bator, 7 sur les bords de la rivière Khurkh près du camp Chinggis Toonot le 21/08 et 8 sur les bords de la rivière Thula le 29/08.

Panure à moustaches *Panurus biarmicus russicus* Bearded Reedling

LC

Au moins 9 le 23/08 à Sum Khurkh Burd.

Alouette des champs *Alauda arvensis* Eurasian Skylark LC

1 le 20 et 21/08 dans la vallée de la rivière Kurkh, 2 individus observés sur une piste le 29/08 entre Elsen Tasarkhaï et le lac Bayan (47.754526°N / 103.9057579°E).

Cochevis huppé *Galerida cristata (magna ?)* Crested Lark LC

Observé uniquement dans la vallée d'Ongi, autour du camp, du 23 au 26/08.

Alouette haussecol *Eremophila alpestris brandti* Shore Lark LC

Observée régulièrement dans la steppe. Abondante uniquement dans le Gobi. Souvent farouche et observable le plus souvent à distance ou en vol.

Alouette de Mongolie *Melanocorypha mongolica* Mongolian Lark LC

Alouette très colorée et corpulente. Observée ponctuellement dans la steppe mais plus abondante dans le Gobi.

Alouette haussecol© Willy Raitière



Alouette de Swinhoe *Alaudala cheleensis* Asian Short-toed Lark LC

Observée dans la partie est de l'itinéraire : désert de Gobi, lac Ogi et lac Bayan. Assez abondante dans le désert de Gobi et autour du lac Ogi notamment.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia taczanowskii* Sand Martin LC

2 à Gun Galutaï le 22/08, 8 dans la vallée d'Ongi le 25/08, 5 à Sangin Dalaï le 26/08, 4 au lac Ogi le 27/08 et 1 sur la lagune située à l'est du lac Ogi le 28/08.

Hirondelle pâle *Riparia diluta diluta* Pale Martin LC

Au moins 3 à Elsen Tasarkhaï le 28/08, une dizaine à Dashinchilen le 29/08 et quelques-unes au lac Bayan le 29/08. Il n'est pas toujours facile de différencier l'Hirondelle pâle de l'Hirondelle de rivage aussi, certains individus ont été laissés non identifiés. Observée également près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica tytleri* Barn Swallow LC

Observée dès le premier jour à l'aéroport d'Oulan Bator (3 individus) puis par la suite sur de nombreuses zones humides. Observée également près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum lagopodum* Northern House Martin LC

Observée uniquement à Dashinchilen le 29/08. Observée également près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* Cetti's Warbler LC

Au moins 1 observée près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus caudatus* Long-Tailed Tit LC

Un groupe de 18 le 21/08 près du camp Chinggis Toonot.

Pouillot de Sibérie *Phylloscopus collybita tristis* Siberian Chiffchaff LC

1 dans la vallée d'Ongi le 24 et 25/08 et 2 dans la taïga du camp Munkhtenger le 30/08.

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* Wood Warler LC

1 dans la vallée d'Ongi le 25/08. Cette espèce est rare en Mongolie avec moins de 10 mentions pour le pays.

Pouillot brun *Phylloscopus fuscatus fuscatus* Dusky Warbler LC

Le pouillot le plus commun. Observé sur chaque zone humide dès qu'il y a quelques buissons ou roseaux. À la suite d'une tombée de passereaux, une 60ne d'oiseaux étaient autour du camp dans la vallée d'Ongi le 25/08.

Pouillot de Pallas *Phylloscopus proregulus* Pallas's Leaf Warbler LC

1 près du camp Chinggis Toonot le 20/08.

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* Yellow-browed Warbler LC

2 à Bogt Khan le 18 et 19/08, une dizaine près du camp Chinggis Toonot le 20 et 21/08, 1 dans la vallée d'Ongi le 24/08, 15 au même endroit le 25/08 et une dizaine au camp Munkhtenger le 30/08.

Pouillot de Hume *Phylloscopus humei humei* Hume's Leaf Warbler LC

1 dans la vallée d'Ongi le 25 et 26/08, 2 près du camp Bayan Gobi le 28 et 29/08. Observé également près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Pouillot boréal *Phylloscopus borealis* Arctic Warbler LC

Pouillot également commun et rencontré un peu partout : ripisylve de la rivière Khurkh, Bogt Khan, camp Chinggis Toonot, camp « Steppe Nomads », vallée d'Ongi et camp Munkhtenger. Observé également près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Pouillot à pattes sombres *Phylloscopus plumbeitarsus* Two-barred Warbler LC

1 dans la vallée d'Ongi le 23/08, 2 au même endroit le 24/08 et 40 (!!!) au même endroit le 25/08.



Pouillot boréal © Willy Raitière

Pouillot verdâtre *Phylloscopus trochiloides* Greenish Warbler LC

Observé près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Rousserolle isabelle *Acrocephalus agricola agricola* Paddyfield Warbler LC

1 dans la vallée d'Ongi le 24/08.

Rousserolle des buissons *Acrocephalus dumetorum* Blyth's Reed Warbler LC

1 observée près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Rousserolle à gros bec *Arundinax aedon* Thick-billed Warbler LC

1 à Bogt Khan le 19/08, 1 au camp « Steppe Nomads » le 22/08, 2 dans la vallée d'Ongi le 23/08, 1 au même endroit le 24/08 et 10 au même endroit le 25/08. Cette espèce a une capacité impressionnante à passer inaperçue dans le moindre buisson, et pourtant, ce n'est pas une petite rousserolle !

Locustelle lancéolée *Locustella lanceolata lanceolata* Lanceolated Warbler LC

1 à Bogt Khan le 19/08 et 1 dans la vallée d'Ongi le 24/08. Les deux individus observés sont très peu marqués sur les flancs, rendant l'identification difficile.

Locustelle de Pallas *Helopsaltes certhiola* Pallas's Grasshopper Warbler LC

3 dans la ripisylve de la rivière Khurkh près du camp Chinggis Toonot le 20/08, 3 dans une prairie humide au bord d'une lagune dans la vallée de la rivière Khurkh (48.3732707°N / 110.2935082°E) le 20/08, 1 dans la ripisylve de la rivière Khurkh près du camp Chinggis Toonot le 21/08, 1 au camp « Steppe Nomads » le 22/08 et 2 dans la vallée d'Ongi le 25/08.



Locustelle de Pallas © Hugo Touzé

Fauvette babillarde *Sylvia curruca blythi/halimodendri* Lesser Whitethroat LC

1 à Bogt Khan le 18 et 19/08, 3 notées près du camp Chinggis Toonot le 21/08, 1 à Sum Khurkh Burd le 23/08, 1 près du camp Bayan Bulag le 23/08, 3 dans la vallée d'Ongi le 24/08, 5 au même endroit le 25/08, 2 près du camp Bayan Gobi le 28/08 et 1 au même endroit le 29/08. Très nombreuses près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Fauvette naine *Sylvia nana* Asian Desert Warbler LC

1 le long de la piste entre le camp Bayan Bulag et Sum Khurkh Burd (46.1483473°N / 105.9256295°E) le 23/08, 1 le long de la piste menant au camp de la vallée d'Ongi le 23/08 (45.3706349°N / 103.9950743°E) et 2 au même endroit le 25/08.

Fauvette grisette *Sylvia communis volgensis* Common Whitethroat LC

1 le long de la piste menant au camp de la vallée d'Ongi le 24/08, 2 observées également près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Sittelle torchepot *Sitta europaea asiatica* Eurasian Nuthatch LC

2 dans la ripisylve de la rivière Thula à Oulan-Bator le 18/08, 4 à Bogt Khan le 18/08, une dizaine dans la ripisylve de la rivière Khurkh près du camp Chinggis Toonot le 20 et 21/08 et notée dans la taïga du camp Munkhtenger le 30/08.

Grimpereau des bois *Certia familiaris daurica* Eurasian Treecreeper LC

1 à Bogt Khan le 18/08.

Martin triste *Acridotheres tristis* Common Myna LC

Nombreux autour de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Etourneau gris *Spodiopsar cineraceus* White-cheeked Starling LC

1 à Umnudelger le 21/08 et 50 dans la queue nord-ouest du lac Ogi le 27/08.

Etourneau roselin *Pastor roseus* Rosy Starling LC

3 oiseaux de première année près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris poltaratskyi* Common Starling LC

1 puis 4 à Umnudelger le 19 et 21/08, 1 au camp du lac Ogi le 27/08 et 90 autour du lac Ogi le 28/08. Observé également près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Grive obscure *Turdus obscurus* Eyebrowed Thrush LC

1 oiseau dans la vallée d'Ongi le 25/08.

Grive à gorge rousse *Turdus ruficollis* Red-throated Thrush LC

2 à Bogt Khan le 18/08 et une dizaine (sans doute des groupes familiaux) au même endroit le 19/08, 8 sur le bord de la rivière Khurkh près du camp Chinggis Toonot le 21/08 et 1 dans la vallée d'Ongi le 25/08.

Grive à ailes rousses *Turdus eunomus* Dusky Thrush LC

Au moins 1 le 21/08 sur le bord de la rivière Khurkh près du camp Chinggis Toonot.

Gobemouche gris *Muscicapa striata mongola* Spotted Flycatcher LC

1 à Bayan Bulag le 22/08. Observé également près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Gobemouche de Sibérie *Muscicapa sibirica sibirica* Dark-sided Flycatcher LC

Une dizaine dans la vallée d'Ongi le 25/08.

Gobemouche de Sibérie © Yves Dubois





Gobemouche à croupion jaune © Hugo Touzé

Gobemouche brun *Muscicapa dauurica dauurica* Asian Brown Flycatcher LC

2 près du camp Chinggis Toonot le 21/08, 1 au beau milieu de la steppe dans le nord du Gobi (46.4010743°N / 106.2641158°E) le 22/08, 1 près du camp Bayan Bulag le 22/08, 2 à Sum Khurkh Burd le 23/08, 2 dans la vallée d'Ongi le 23 et le 24/08, 40 (!!!) au même endroit le 25/08, 5 près du camp Munkhtenger le 30/08.

Rossignol siffleur *Larvivora sibilans* Rufous-tailed Robin LC

1 individu émet une strophe de son chant le 30/08 au camp Munkhtenger.

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* Bluethroat LC

1 à Sum Khurkh Burd le 23/08 et 1 au lac Ogi le 27/08.

Calliope de Sibérie *Calliope calliope* Siberian Rubythroat LC

1 à Bogt Khan le 18 et 3 le 19/08, 1 près du camp Chinggis Toonot le 21/08 et 1 près du camp Munkhtenger le 30/08. Seuls des individus mâles ont été observés.

Robin à flancs roux *Tarsiger cyanurus* Red-flanked Bluetail LC

2 à Bogt Khan le 18/08 et une dizaine au même endroit le 19/08.

Gobemouche à croupion jaune *Ficedula zanthopygia* Yellow-rumped Flycatcher LC

1 dans la vallée d'Ongi le 24 et le 25/08.

Gobemouche de la taïga *Ficedula albicilla* Taiga Flycatcher LC

Noté partout, y compris parfois au milieu de la steppe. Nous étions probablement dans le pic de passage de cette espèce. À la suite d'une tombée de passereaux dans la vallée d'Ongi dans la nuit du 24 au 25/08, ce sont environ 110 individus qui ont été observés sur ce site le 25/08.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus phoenicurus* Common Redstart LC

2 à Bogt Khan le 18 et 19/08, 1 le 20/08 près du camp Chinggis Toonot.

Rougequeue aurore *Phoenicurus auroreus auroreus* Daurian Redstart LC

1 à Bogt Khan le 19/08, une trentaine (dont des groupes familiaux) près du camp Chinggis Toonot le 20 et 21/08.



Rougequeue aurore © Willy Raitière

Tarier de Stejneger *Saxicola stejnegeri* Stejneger's Stonechat NE

1 à Bogt Khan le 19/08, 1 près du camp Chinggis Toonot le 20 et 2 au même endroit le 21/08, 1 dans la vallée de la rivière Khurkh le 20/08, 3 au sud-ouest de Sum Khurkh Burd (46.0380794°N / 105.4186639°E) le 23/08 et 2 dans la vallée d'Ongi le 25/08.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* Northern Wheatear LC

1 à Bogt Khan le 18/08, 1 à Gargal Tkhan le 19/08, 1 dans la vallée de la rivière Khurkh le 20/08 et le 21/08, 4 à Umnudelger le 21/08, noté près du camp Bayan Gobi le 28/08.

Traquet isabelle *Oenanthe isabellina* Isabelline Wheatear LC

Observé un peu partout dans les zones de steppes ainsi que les zones vallonnées : Bogt Khan, Gargal Tkhan, Bayan Bulag, Sum Khurkh Burd, vallée d'Ongi, Bayan Gobi et lac Ogi.

Traquet du désert *Oenanthe deserti deserti* Desert Wheatear LC

Observé uniquement dans le Gobi : au camp Bayan Bulag le 22/08 et dans les zones rocheuses avant d'arriver au camp de la vallée d'Ongi le 24 et 25/08 (respectivement 2 et 4 individus).

Traquet pie *Oenanthe pleschanka* Pied Wheatear LC

2 à Bogt Khan le 18/08 et 3 au même endroit le 19/08, une dizaine le long de la piste menant à Bayan Bulag et 1 au camp de Bayan Bulag le 22/08, 1 sur la piste un peu plus au sud du camp et une dizaine le long de la piste le 23/08, 2 dans la vallée d'Ongi le 24 et 25/08 et 3 puis 4 près du camp Bayan Gobi le 28 et 29/08. Affectionne les zones rocheuses.

Moineau domestique *Passer domesticus* House Sparrow LC

Observé autour des habitations pérennes : à Oulan Bator (aéroport notamment), à Sum Khurkh Burd, dans la vallée d'Ongi et au lac Ogi.

Moineau friquet *Passer montanus montanus* Eurasian Tree Sparrow LC

Observé partout et souvent abondant. Une bande d'environ 80 a été observée sur le bord de la rivière Thula à Oulan Bator le 18/08.

Moineau soulcie *Petronia petronia brevirostris* Rock Sparrow LC

Présent dans les zones rocailleuses : un groupe d'environ 250 le 22/08 au camp « Steppe Nomads » puis noté à Bayan Bulag, dans la vallée d'Ongi et au bord du lac Ogi.

Niverolle du Père David *Pyrgilauda davidiana davidiana* Pere David's Snowfinch LC

Observée principalement dans les steppes de la partie sud de l'itinéraire. L'espèce était très abondante (avec des groupes de plusieurs centaines d'oiseaux) autour du lac Ogi et dans la steppe autour de Sangin Dalaï.

Bergeronnette printanière orientale *Motacilla tschutschensis* Eastern Yellow Wagtail LC

Observée tout au long du séjour sur des zones humides mais des groupes d'oiseaux en halte migratoire dans la steppe ont également été observés.

Bergeronnette citrine *Motacilla citreola citreola* Citrine Wagtail LC

Observée quasi quotidiennement, principalement dans les zones humides.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea cinerea* Grey Wagtail LC

Observée quasi quotidiennement également, dès qu'il y a de l'eau.

Bergeronnette grise *Motacilla alba baicalensis* White Wagtail

LC

Observée le long de la rivière Thula à Oulan Bator, à Bogt Khan, près du camp Chinggis Toonot, à Gun Galutaï, à Sum Khurkh Burd, dans la vallée d'Ongi, au lac Ogi, à Elsen Tasarkhaï et au camp Munkhtenger. Une dizaine de Bergeronnettes grises de la sous-espèce *personata* a été observée autour de l'aéroport de Bichkek le 30/08.



Bergeronnette grise personata © Hugo Touzé

Pipit de Richard *Anthus richardi* Richard's Pipit

LC

Observé très régulièrement tout au long du séjour, principalement dans les zones de steppe herbeuse et en bordure de zones humides.

Pipit de Godlewski *Anthus godlewskii* Blyth's Pipit LC

Observé tout d'abord le 22/08 avec un couple nicheur dans l'enceinte du camp « Steppe Nomads ». Contacté ensuite quotidiennement, en particulier autour du lac Ogi où les densités étaient importantes.

Pipit des arbres *Anthus trivialis* Tree Pipit LC

1 près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Pipit à dos olive *Anthus hodgsoni* Olive-backed Pipit LC

1 à Bogt Khan le 18/08, 10 au même endroit le 19/08, 1 près du camp Chinggis Toonot le 20/08, une dizaine au même endroit le 21/08, noté dans la vallée d'Ongi le 24/08 où une quinzaine ont été dénombrés le 25/08, 1 au lac Ogi le 27/08 et une quinzaine dans la taïga au camp Munkhtenger le 30/08.



Pipit à dos olive © Willy Raitière

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* Hawfinch LC

8 près du camp Chinggis Toonot le 20/08.

Roselin cramoisi *Carpodacus erythrinus grebnitskii* Common Rosefinch LC

Assez commun dès qu'il y a des arbres. A noter au moins 80 oiseaux dans la vallée d'Ongi le 25/08. Aucun mâle rouge n'a été observé, à l'exception d'un individu près de l'aéroport de Bichkek le 30/08.

Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephalos leucocephalos* Pine Bunting LC

10 à Bogt Khan le 19/08.

Bruant à longue queue *Emberiza cioides cioides* Meadow Bunting LC

Observé uniquement sur les flancs de la montagne située à côté du camp Bayan Gobi : 5 le 28/08 et 4 le 29/08.

Bruant à cou gris *Emberiza buchanani neobscura* Grey-necked Bunting LC

Observé uniquement sur les flancs de la montagne située à côté du camp Bayan Gobi : 4 le 28/08 et 4 le 29/08.

Bruant auréole *Emberiza aureola* Yellow-breasted Bunting CR

1 le 28/09 près du camp Bayan Gobi.

Bruant masqué *Emberiza spodocephala* Black-faced Bunting LC

Au moins 2 près du camp Chinggis Toonot le 21/08.

Bruant de Pallas *Emberiza pallasi* Pallas's Reed Bunting

LC

Observé uniquement dans la partie est de l'itinéraire : au moins 2 à Sum Khurkh Burd le 23/08, 4 dans la vallée d'Ongi le 24/08, 1 au même endroit le 25/08 et 2 au même endroit le 26/08, quelques-uns à Sangin Dalaï le 26/08, nombreux autour du lac Ogi le 27 et 28/08, ainsi qu'au lac Bayan le 29/08.



Bruant de Pallas © Willy Raitière

Réflexions sur la migration

La période choisie est manifestement très bonne pour les limicoles migrateurs, comme en témoigne les groupes importants de Pluviers fauves ou de Bécasseaux minutes en halte. La diversité d'espèces est remarquable et chaque zone humide, même temporaire, est exploitée par des limicoles pour refaire leurs réserves avant de poursuivre leur périple migratoire. La migration battant son plein, le revers de la médaille est l'absence d'observation du Pluvier oriental, nicheur local et donc vraisemblablement déjà parti vers ses quartiers d'hivernage.

Les rapaces sont omniprésents à cette époque de l'année mais les observations concernent principalement des nicheurs locaux, parfois rassemblés en groupe familiaux. Cependant, les observations de groupes de Bondrées orientales, de Buses des steppes et d'une Buse féroce concernent des oiseaux en migration active.

En ce qui concerne les passereaux, la migration est également déjà bien entamée à la fin août, comme en témoigne l'observation dans la vallée d'Ongi le 25 aout de centaines de gobemouches et de pouillots bloqués par les conditions météorologiques défavorables. Il semble en revanche que les bruants et les turdidés ne soient pas encore arrivés sous ces latitudes à cette période car les observations de ces groupes d'espèces ont été rares. La première décade de septembre est probablement plus favorable pour ces espèces.

Autre faune

Reptiles

Eremias arguta Steppe Runner,

Eremias argus Mongolian racerunner,

Agame à tête de crapaud *Phrynocephalus mystaceus* Toad-headed

Agama, *Gloydius halys* Siberian Pit Viper



Gloydius halys © Willy Raitière

Amphibiens

Crapaud de Radde *Strauchbufo raddei* Mongolian Toad

Grenouille des bois *Rana amurensis* Siberian Wood Frog

Mammifères

Campagnol de Brandt *Lasiopodomys brandtii* Brandt's vole

Pika de Daourie *Ochotona dauurica* Daurian pika

Pika de Pallas *Ochotona pallasi* Pallas's Pika

Gazelle à queue blanche *Procapra gutturosa* Mongolian gazelle

Souris grise des rochers *Alticola semicanus* Mongolian silver vole

Putois des steppes *Mustela eversmannii* Steppe Polecat

Renard corsac *Vulpes corsac* Corsac Fox

Renard roux *Vulpes vulpes* Red Fox

Blaireau asiatique *Meles leucurus* Asian Badger

Chevreuil de Sibérie Capreolus pygargus Siberian Roe Deer

Argali Ovis ammon

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Red Squirrel

Marmotte de Sibérie Marmota sibirica Tarbagan marmot

Tamia de Sibérie Tamias sibiricus Siberian chipmunk

Souslik à longue queue Spermophilus undulatus Long-tailed Ground Squirrel

Souslik Spermophilus pallidicauda Pallid Ground Squirrel

Gerboise sp. Allactaga sp. Jerboa sp.

Lièvre de Tolai Lepus tolai Tolai Hare

Hérisson *Hemiechinus dauuricus* Daurian Hedgehog



Tamia de Sibérie © Willy Raitière

Papillons

Bombyx disparate *Lymantria dispar*

Marbré kurde *Pontia chlorodice*

Petite tortue *Aglais urticae*

Machaon *Papilio machaon*

Belle dame *Vanessa cardui*

Piéride de la rave *Pieris rapae*